


دوره خاصه برائے مجاہدین علم المتفجرات (بارو)



مہدود

معسكر عبدالله بن مبارك

بنعازہ

معسكر الفاروق (افغانستان)

فلا تنسونا من صالح دعائکم

استاد لوی دراز شہید پبلیکیشنز



☆ BAROOD AND POISON ☆ بارود اور زہر

SAFETY PRECASIONS حفاظتی اقدامات

اس کے دو حصے ہیں

- 1) بارود کے حفاظتی اقدامات SAFETY PRECASION OF BAROOD
- 2) زہر کے حفاظتی اقدامات SAFETY PRECASIONS OF POISON

SAFETY PRECASION OF BAROOD :- بارود کے حفاظتی اقدامات :-

- (i) تمام بارود زہرے لے اور بہت جلد آگ پکڑنے والے اور دھماکے سے بھرنے والے ہوتے ہیں۔
- (ii) یہ ٹھوس اور مائع دونوں حالتوں میں استعمال کیا جاتا ہے اسکے لیے دوران تیاری اور تیار ہونے کے بعد ان کو ہتائے ہوئے طریقوں کے مطابق سٹور کریں اور ذرا ہر بھی بے احتیاطی نہ کریں۔
- (iii) دوران تیاری اپنے ہاتھوں، چہرے اور جسم کے کھلے ہوئے حصوں کو کسی قسم کا بارود نہ لگنے دیں۔

SAFETY PRECASIONS OF POISON :- زہر کے لئے احتیاطیں :-

- زہر ٹھوس اور مائع شکل میں پایا جاتا ہے۔
- زہر کو تیار کرتے وقت ہاتھوں پر دستانے، چہرے پر ماسک، آنکھوں پر حفاظتی چشمہ لگائیں۔
- کسی قسم کے زخم کو خصوصاً چہرے اور ہاتھوں کو خصوصی توجہ سے دیا جائے۔
- اگر نعلی سے لگ جائے تو سکون سے علاج کریں۔

تیار سازی میں کام کرتے وقت حفاظتی تدابیر :- SAFETY PRECASIONS

1. ہاتھ کا کوئی حصہ نہ لگے جسے استعمال کریں۔

2. کھلے کاغذ ہرگز استعمال نہ کریں۔
3. لیبارٹری میں کیے گئے ہر کام کی تفصیل لکھیں۔
4. اپنے دماغ پر زیادہ اعتماد نہ کریں۔
5. اپنے تجربات کو بیان کریں۔
6. اگر رکھنے کے دوران غلطی ہو تو طریقہ سے کاٹیں۔
7. اپنی کاپی کو صاف اور منظم رکھیں۔
8. اپنے تجربات کی تاریخ اور وقت اور اس کا مقصد ضرور لکھیں۔
9. اپنے تجربات کی روشنی میں نتیجہ ضرور لکھیں۔
10. لیبارٹری میں بغیر دستاے کسی چیز کو نہ چھوئیں۔
11. لیبارٹری میں کھانا پینا سختی سے منع ہے۔

لیبارٹری میں استعمال ہونے والی اشیاء اور کپٹرے۔

1. صرف وہ چیزیں ساتھ لائیں جو ضروری ہوں۔
2. ایسے کپڑے پہنیں جو آسانی سے دھل جائیں اور ٹائٹ کف والے ہوں۔
3. لیبارٹری میں انگوٹھی، ناکی اور ادنیٰ کپڑے نہ پہنیں۔
4. کام کرتے وقت دستاے ضرور پہنیں۔
5. جو عناصر کام کرتے وقت جلیبے پیدا کریں اس لئے حفاظتی عینک لازمی پہنیں۔
6. ٹخن ہمیشہ صاف اور کٹے ہوئے ہونے چاہئے۔
7. زخم پر وائرم پروف پلاسٹر ضرور چڑھائیں۔
8. کام کے دوران ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو نہ چھوئیں۔
9. کسی بھی چیز کو بغیر اجازت نہ چھوئیں۔
10. شروع شروع میں میں بڑی مقدار تیار نہ کریں۔
11. نئے آنے والے کو خطرناک عناصر سے دور رکھیں۔

12. لیبارٹری میں مت بھاگیں۔
13. پٹائی کے بارود کو فرش پر مت گرائیں۔
14. بارود کے بکس کے ساتھ مت کھیلیں۔
15. بغیر علم اور استاد کے عناصر کو ملانے کی کوشش نہ کریں۔
16. اپنے کام پر مکمل توجہ دیں۔
17. لیبارٹری کے کسی بھی برتن میں کھانا پینا پختی سے منع ہے۔
18. لیبارٹری کے ٹل سے پانی نہ پیئیں۔
19. کام کرنے کے بعد سامان کا صاف کر کے اپنی جگہ پر رکھیں۔
20. عناصر کے بیچ ہوئے اجزاء فرش پر مت گرائیں۔
21. لیبارٹری میں ہونے والے کام کی تفصیل اپنے استاد کو دیں۔

لیبارٹری کو محفوظ رکھنے کی شرائط :- IMPORTANT

1. کم سے کم طالب علم ہونے چاہئیں تاکہ استاد ہر کسی کو نظر میں رکھ سکے۔
2. ہر طالب علم کو دو میٹر جگہ دیں۔
3. گیس اور بجلی کے کنکشن درست اور بہتر حالت میں رکھیں۔
4. غیر ضروری کنکشن بند رکھیں۔
5. اپنے طالب علم کو ہر وقت نظروں میں رکھنا چاہیے۔
6. میز کو فائر ریٹیکلڈ سے کور کریں۔
7. لیبارٹری کا فرش چمکانا نہیں ہونا چاہیے تاکہ پاؤں نہ پھسلے۔
8. لیبارٹری کا انتخاب کھلی اور ہوا دار جگہ پر کرنا چاہیے۔
9. لیبارٹری میں گیس کی بجائے بجلی والا میٹر استعمال کریں۔
10. اپنے پاس میٹ ایڈیکس ضرور رکھیں۔
11. لیبارٹری کے اندر کیونکس (CANWIOUS) شوز استعمال کریں۔

12. ہر چیز صاف تھری اور ترتیب سے رکھیں۔
13. بارہ فیصد الکل والی محلول ایسی جگہ پر رکھیں جہاں استعمال ہو۔
14. آگ بجانے والے آلات نزدیک اور درست کر کے رکھیں۔
15. لیبارٹری میں شعلہ پیدا کرنے سے گریز کریں۔
16. کام کے دوران مکمل خاموشی رکھیں۔
17. لیبارٹری میں آمدورفت کیلئے کم از کم دورا سٹے ہوں۔
18. لیبارٹری کے ساتھ ایچ ہاتھ رکھیں۔
19. لیبارٹری میں گیس ماسک کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔
20. کبھی بھی مین چارٹ اور ڈیوٹی ریکورڈ کو اکٹھا نہ رکھیں۔
21. لیبارٹری میں سگریٹ نہ پینا سخت منع ہے۔
22. لیبارٹری کو بونیٹ پلس سے محفوظ رکھیں۔
23. لمبے بالوں اور ڈاڑھی کے ساتھ شعلہ کے قریب مت جائیں۔
24. گیس والا چولہا استعمال کریں تو استعمال سے پہلے تیلی ضرور جالیں۔
25. شعلہ کے پاس جلتے چیز نہ رکھیں۔
26. گرم چیز اٹھانے کیلئے دستانوں کے بجائے کپڑا استعمال کریں۔

FARMULAAS فارمولے

1. گندھک کا تیزاب H_2SO_4 پیڑی کے پانی سے حاصل ہوتا ہے۔
2. شورے کا تیزاب HNO_3 کھاد اور گندھک کے تیزاب سے حاصل ہوتا ہے۔
3. امونیم نائٹریٹ HN_4NO_3 یہ عام دستیاب ہے۔
4. پارہ (مرکری) Hg یہ قمر مائٹرم میں استعمال اور عام دستیاب ہے۔
5. الکلوس C_2H_5OH شراب کا اہم جزو اور عام دستیاب ہے۔
6. پوٹاشیم کلورائیٹ $KClO_3$ یہ مارجس بنانے اور کپڑوں کو بلیچ کرنے کے کام آتا ہے۔

- اسے پیسہ سفیدی بھی کہتے ہیں۔
7. سوڈیم ایزائیڈ Na_6N یہ غورتوں کے حمل ٹٹ کرنے کے کام آتا ہے۔
8. لیڈ ٹائیٹرینٹ $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ یہ سیسہ اور شورہ کے تیزاب سے حاصل ہوتا ہے۔
9. سوڈیم کاربونیٹ Na_2CO_3 یہ عام دستیاب ہے اسے دھوبی سوڈا کہتے ہیں۔
10. سوڈیم ہائی کاربونیٹ NaHCO_3 اسے بیٹھا سوڈا کہتے ہیں۔
11. ایسی ٹون CH_3COCH_3 یہ نیل پالش ریور میں ہوتا ہے۔
12. پوٹاشیم ٹائیٹرینٹ KNO_3 یہ سفید پوٹاش ہے اور کیسٹ سے دستیاب ہے۔
13. لیڈ ایزائیڈ PbN_6 لیڈ ٹائیٹرینٹ اور سوڈیم ایزائیڈ سے بنتا ہے۔
14. کاربن C یہ عام دستیاب ہے۔
15. سلفر S یہ پھاری اور کیسٹ سے عام دستیاب ہے۔
16. المونیم پوڈر Al یہ چپٹ میں چمک پیدا کرتا ہے۔
17. بنزین C_6H_6 یہ سپر پٹرول کے نام سے دستیاب ہے۔
18. نائٹرو بنزین $\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2$ یہ میری بان آئل کے نام سے دستیاب ہے۔
19. یوریا CNH_2 یہ کھاد ہے اور عام دستیاب ہے۔
20. یوریا ٹائیٹرینٹ $(\text{NH})_2\text{C}(\text{NO}_3)_2$ یہ یوریا شورے کے تیزاب اور پانی سے بنتا ہے۔
21. مرکری ٹلیسٹ $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + \text{Hg} + \text{HNO}_3$ یہ بنتا ہے۔
22. پوٹاشیم پرمینگنیٹ (پنگلی) KMNO_4 یہ ہینٹالوں میں عام دستیاب ہے۔
23. مگنیسیئم پاؤڈر Mg کیسٹ سے عام دستیاب ہے۔
24. سلور ٹائیٹرینٹ $\text{Ag}(\text{NO}_3)_3$ یہ $\text{Ag} + \text{HNO}_3$ سے بنتا ہے۔
25. ہیکسامین پراکسائیڈ $\text{H}_2\text{N}(\text{CH}_2)_6\text{NH}_2$ ہیکسامین اور پانی سے بنتا ہے۔
26. سوڈیم فیرو سائیٹائیڈ NaFeCN یہ پرننگ میں کام آتا ہے۔
27. کیلیشیم فیرو سائیٹائیڈ CaFeCN یہ پرننگ میں کام آتا ہے۔

28. پوٹاشیم فیرو سائیڈائیڈ KFeCN یہ پرنٹنگ میں کام آتا ہے۔
 29. پوٹاشیم کاربائیڈ K_2CO_3 مارکیٹ سے عام دستیاب ہے۔
 30. سوڈیم کاربائیڈ Na_2CO_3 مارکیٹ سے عام دستیاب ہے۔
 31. کیلشیم کاربائیڈ Ca_2CO_3 مارکیٹ سے عام دستیاب ہے۔
 32. ہائیڈروجن سلفائیڈ H_2S مارکیٹ سے عام دستیاب ہے۔
 33. نمک کا تیزاب HCl مارکیٹ سے عام دستیاب ہے۔

نمبر 1. تیزابیوں کی تیاری PREPARATION OF ACIDS

اس کورس میں ہمیں دو اہم تیزابیوں کی ضرورت ہے جن کو ہم باآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔

1. گندھک کا تیزاب SULFURIC ACID

2. شورے کا تیزاب NITRIC ACID

گندھک کا تیزاب حاصل کرنے کا طریقہ

یہ عام گاڑیوں میں استعمال ہونے والی بیٹریوں میں موجود پانی میں پایا جاتا ہے بیٹریوں میں کمزور حالت میں پایا جاتا ہے اسلئے ہم اسے شیشے کے برتن میں رکھ کر حرارت کے ذریعے ہال کر خالص کریں گے یہاں تک کہ یہ اپنے حجم کا تیسرا حصہ رہ جائے یہ بخون کی شکل کا ہوگا جو کہ خاصی فیصد خالص ہو سکتا ہے

گندھک کے تیزاب کو چمک کرنے کا طریقہ۔

اس تیزاب کو چمک کرنے کے لئے ہم چینی اور پوٹاشیم کلورائیڈ کا تیار کردہ مرکب جو کہ مندرجہ ذیل تناسب کا ہوگا

چینی ☆ ایک حصہ + پوٹاشیم کلورائیڈ ☆ ایک حصہ

پوٹاشیم کلورائیڈ اور چینی کو پیسٹہ پیسٹہ جہاں ایک جیس لیں اور پھر مقدار میں ملا لیں اس مرکب کی کچھ مقدار لوہے کی شیٹ یا اینڈ پر ڈالیں اور اس پر بیٹری کے پانی سے حاصل کردہ تیزاب کا ایک قطرہ ڈالیں تو یہ بہت تیز شعلہ دے گا اور اس جگہ کو سیاہ کر دے گا جو یہ ثابت کرے گا کہ ہمارا تیزاب ٹھیک ہے اس مرکب کو ہم ہانہم کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔

ٹائم بم ☆ TIME BOM

نامیم بنانے کے لئے ایک میڈیکل کپسول لیں اور اس کو گندھک کے تیزاب سے بھر لیں۔
 1:1 کے تناسب کا (پوٹاشیم کلورائیٹ + چینی) کے آمیزے کے درمیان اس کپسول کو رکھ دیں تھوڑی دیر بعد تیزاب کپسول کو
 کھانچا جائے گا اور کپسول سے باہر آ کر آمیزے کے ساتھ مل کر شعلہ پیدا کرے گا جو کہ بیٹری یا چارج کو چھٹانے کے لئے کا
 فی ہوگا۔

نوٹ ☆☆☆ NOTE

اگر آپ اس نام کو بڑھانا چاہتے ہیں تو کپسول کو ذیل کر کے اس کے اندر گلیسرین کے ایک یا دو قطرے ڈال دیں وہ تیزاب
 کے کیسائی رد عمل کو ست کر دے گا۔

شورے کا تیزاب حاصل کرنے کا طریقہ
 یہ گندھک کے تیزاب اور امونیم نائٹریٹ (کھاد NH_4NO_3) سے حاصل ہوتا ہے ہم ان دونوں کا مندرجہ
 ذیل تناسب لحاظ ختم لیں گے۔

گندھک کا تیزاب = 2 حصہ + امونیم نائٹریٹ = 1 حصہ

نوٹ ☆☆☆ NOTE

امونیم نائٹریٹ کھاد ہوا سے نمی جذب کرتی ہے اس لئے اس کا خشک ہونا ضروری ہے اگر خشک نہ ہو تو
 HOT SAND BATH سے کر خشک کریں۔

تیاری PREPEARATION

امونیم نائٹریٹ کو باریک ٹیس لیں اور اس کو ایک گول پینڈے والی صراحی میں ڈال دیں اب اس صراحی میں گندھک کا
 تیزاب آہستہ آہستہ ڈالیں جو کہ حسب مقدار ہوگا اس میں فوری رد عمل RE.ACTION شروع ہوگا اور سفید رنگ کا گہرا
 دھواں اٹھے گا جب رد عمل سست ہو اور دھواں ختم ہو جائے تو صراحی کو دائرہ کول کنڈر
 سر WATER.COOL.CONDUNSER کے ساتھ ملا دیں کنڈنسر کے دوسرے سرے کے ساتھ ایک رنگ
 دار بوتل منسلک کر دیں جو کہ برف والے برتن میں ہونی چاہئے اب صراحی کو بیٹر کی مدد سے گرمی دینا شروع کریں یہ بخلول
 تقریباً 75.c پر ابلے گا کنڈنسر میں پانی کے بہاؤ کو چالو کریں کچھ دیر بعد صراحی میں گہرے رنگ کے بخارات اٹھیں گے جو کہ

کنڈر میں سرور ہو کر مانع حالت میں کنڈر میں جمع ہو جائیں گے یہی شورے کا تیزاب ہے جو کہ 95% خالص ہو سکتا ہے اس طریقہ سے ہم کل مرکب کا چوتھائی حصہ حاصل کر سکتے ہیں تیار شدہ شورے کا تیزاب کو اندھیری جگہ پر سٹور کریں۔

تیاری کے دوران احتیاطیں

DURING PREPARATION SAFETY PRECAUTIONS

جب ہم امونیم نائٹریٹ کھاد میں گندھک کا تیزاب ڈالیں گے تو اس میں فوری کیمیائی رد عمل شروع ہو جاتا ہے اور گہرے رنگ کے بخارات اٹھتے ہیں ان سے بچیں یہ نہایت زہریلے ہیں۔
کیمیائی رد عمل کوست کرنے کے لئے اس میں چند لوہے یا شیشے کے ٹکڑے ڈال دیں۔
Leakage کو روکنے کے لئے ویزلین کا استعمال کریں کیوں کہ یہ کافی نقصان دہ ہیں۔

نمبر 2. مرکری فلیمنٹ ☆☆ MURCURY.FULMINATE.

ہمارے کورس میں یہ پہلا اور حساس بارود ہے یہ مختلف رنگوں میں پایا جاتا ہے اگر اس کا سلیٹی رنگ سب سے طاقتور ہے یہ بھورے رنگ میں بھی ہوتا ہے یہ رنگ دوران تیاری درجہ حرارت میں کمی بیشی کی وجہ سے ہوتا ہے پاؤں کی ٹھوکر پکڑے اور انسانی جسم میں موجود برقی رو سے پھٹ جاتا ہے اور زیادہ گرمی سے ٹپٹ جاتا ہے اگر اس میں پندرہ فیصد نجی ہو تو صرف جلے گا اور اگر اس میں زیادہ نجی ہو تو جلتا بھی نہیں اس کا کشافنی وزن 4.48 ہے یعنی سینٹ سے تین گنا زیادہ ہے۔

اس میں مندرجہ ذیل عناصر استعمال ہوتے ہیں۔

1. بدھتھائل ایلکول C2H5OH

2. مرکری HG

3. شورے کا تیزاب HNO3

PREPARATION OF EVINT

1. شورے کا تیزاب گیارہ فی لیٹر خالص لیں اور اس میں پندرہ گرام مرکری ملا دیں حل ہونے کے دوران اس میں بھورے

- رنگ کے ذرات اسٹیم بنے گے بعد میں اس کا رنگ بیز ہو جائے گا۔
2. ایک دوسرے بیکر میں تیرا ملی لیٹر الکوکل لیں۔
3. بیکر 1 نمبر ایک کو 9 ڈگری سینٹی گریڈ اور بیکر نمبر دو کو 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک حرارت دیں۔
4. جب دونوں بیکر مطلوبہ درجہ حرارت پر پہنچیں تو بیکر 1 نمبر ایک کو بیکر نمبر دو میں ڈال دیں۔
- (دونوں کا درجہ حرارت 12 ڈگری سے زیادہ ہوتا چھا ہے)
5. اگر درجہ حرارت میں کمی کی وجہ سے رد عمل شروع نہ ہو تو اس وقت تک گرم کریں جب تک رد عمل شروع نہ ہو۔
6. تھوری دیر کے بعد بیکر میں بلبے بننا شروع ہو جائیں گے اور دھوین کے سفید بادل انھیں گے جو آگ پکڑ سکتے ہیں اس لئے محلول کو آگ سے دور رکھیں۔
7. اگر رد عمل تیز ہو تو اس میں چند قطرے الکوکل ڈال دیں۔
8. جب عمل پورا ہو جائے گا تو بیکر کی تہہ میں سلیٹی رنگ کے کرمل ملیں گے جو کبھ کر کی فلیمیٹ ہے۔
9. اس کو فلٹر کریں پانی سے دھوئیں اور اس کے بعد الکوکل سے۔
10. حاصل شدہ ذرات کو ہوا میں سایہ دار جگہ پر خشک کریں اور 15 سے 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک خشک جگہ پر اسٹور کریں اور نمی سے بچائیں۔
- نوٹ ☆☆☆☆
- درجہ حرارت کا خاص خیال رکھیں اور بیکروں کو ملاتے وقت اوسط درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے ضرورت پر رد عمل تیز کر کے لئے درجہ حرارت 45 سے 75 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی بڑھائیں۔
- دھاتوں کے ساتھ رد عمل ☆☆☆☆
1. یہ نیکی کی موجودگی میں پلاسٹک اور تانبہ کے ساتھ کسی قسم رد عمل نہیں کرتا ہے اس لئے اسکو اسٹور کرنے کیلئے پلاسٹک کی بوتلیں استعمال کرتے ہیں ڈیوٹھیر بنانے کیلئے ہم تانبے کے پائپ استعمال کرتے ہیں۔
2. یہ صرف اور صرف المونیم کے ساتھ رد عمل کرتا ہے اور ایک نیا عنصر بنا دیتا ہے جو کہ پھلتا نہیں اور اسکی بارودی خاصیت ختم ہوتی ہے اسلئے ہم المونیم میں داس کو اسٹور کرتے ہیں نہ اس لئے پٹائی بناتے ہیں۔
3. اسٹور کرنے کیلئے ہم خشک اور خشکی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں۔

2. نمبر:- لیڈائیڈ LEAD AZIDE

یہ تیارہ چاقی کے بارودوں میں دوسرا روہ ہے اور ایڈائیڈ میں پہلا بارود ہے۔

طبی خواص ☆☆☆

1. یہ سفید رنگ کے ذرات ہوتے ہیں جس کا مخصوص وزن 4.8 ہے۔
2. یہ مرکری ٹیسٹ سے کم حساس ہے لیکن اس میں دھماکے کی طاقت زیادہ ہے۔
3. اگر ہم اس میں لوہے یا پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈال دیں تو یہ دھچکے یا چوٹ حساس ہو جاتا ہے۔ اور پھٹ جاتا ہے اس کو نیم (BNOACT BOMS) میں استعمال کرتے ہیں۔
4. اسکو ہم المونیم اور زنک (ZNC) میں استور کرتے ہیں اور چاقی بھی عام طور پر المونیم کی بناتے ہیں
5. اس کو کبھی تاپنے (COPPER) میں استور نہ کریں اور نہ ہی اس کی چاقی بنائیں کیوں کہ یہ تاپنے کے ساتھ مل کر کارپائیڈ (COPPER) بنا دیتا ہے جو کہ بہت حساس ہے یہ معمولی حرکت یا خود بخود بھی پھٹ جاتا ہے 6. یہ پانی میں حل نہیں ہوتا۔
7. اگر اسکو روشنی میں رکھیں گے تو اسکے اوپر کی سطح پر ایک سلیٹی مائل پتلی تہہ بن جائے گی جو کہ باقی ایڈائیڈ کو روشنی سے بچاتی ہے بہتر ہے کہ اس کو ہم اندھیرے میں خشک کریں اور اندھیرے میں ہی استور کریں۔
8. یہ 80 ڈگری سینٹی گریڈ پر پھٹ جاتا ہے اور اس کے پھٹنے کی رفتار 5300 میٹر فی سیکنڈ ہے۔

تیاری ☆☆☆

ایڈائیڈ کو تیار کرنے کے لئے ہم کو دو عناصر کی ضرورت ہے۔

1. ایڈائیڈ میٹیریل: $Pb(NO_3)_2$ ۔ مارکیٹ میں عام دستیاب ہے اور شورے کے تیزاب اور سیسے (LEAD) کی مدد سے خود بھی بنایا جا سکتا ہے۔
2. سوڈیم ایڈائیڈ: (Na_6N) یہ میڈیکل مشورے عام دستیاب ہے اور عورتوں کے حمل کو چیک کیلئے کام آتا ہے۔

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ لیڈنا نیٹرٹ کی تیاری

اس کے لئے کچھ مقدار سیسہ کی لیس اس کو بیکر میں ڈالیں اس میں کچھ شورے کا تیزاب ڈالیں شورے کا تیزاب فوراً سیسہ کے ساتھ رد عمل شروع کر دے گا اور سفید رنگ کے ذرات بیکر کی تہہ میں پھینسا شروع ہو جائیں گے جب یہ رد عمل رک جائے تو بیکر کو اور حرارت دیں رد عمل دوبارہ شروع ہو جائے گا سفید ذرات ہی ہمارا لیڈنا نیٹرٹ ہے لیڈنا نیٹرٹ میں موجود باقی ماندہ تیزاب کو گرمی دے کر یا فلٹر کر کے خشک کریں اس کو ہرگز پانی سے نہ دھوئیں یہ طاقتور زہر ہے۔

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ لیڈنا نیٹرٹ کی تیاری

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ مقدار:-

لیڈنا نیٹرٹ 7 گرام + پانی 93 ملی لیٹر = 100 گرام
سوڈیم ایزائیڈ 4 گرام + پانی 96 ملی لیٹر = 100 گرام
کل مکس = 200

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ تیاری

1. ایک بیکر میں سات گرام لیڈنا نیٹرٹ لیں اور اس کو 93 ملی لیٹر میں اچھی طرح حل کریں۔
2. دوسرے بیکر میں 4 گرام سوڈیم ایزائیڈ لیں اور اس کو 96 ملی لیٹر پانی میں اچھی طرح حل کریں۔
3. اب بیکر نمبر 2 کو بیکر نمبر 1 میں اغیل دیں اور اس کو چلائیں۔
4. اس میں فوراً سفید رنگ کے ذرات بن جائیں گے جو کہ لیڈنا نیٹرٹ ہے۔
5. ان ذرات کو فلٹر کریں پانی سے دھوئیں اور ان کو اندھیری جگہ پر خشک کریں اور اسٹور کریں۔

نمبر 4 سلور ایزائیڈ

یہ پٹاشی کے بارودوں میں تیسرا بارود ہے اور ایزائیڈ میں دوسرا سلور ایزائیڈ کو بنانے کا طریقہ بالکل وہی ہے جو لیڈنا نیٹرٹ کا ہے صرف اس میں لیڈنا نیٹرٹ کے بدلے سلور نیٹرٹ $Ag(NO_3)$ استعمال ہوتا ہے تیاری کے مراحل بالکل ایک جیسے ہیں۔

سلورٹائیٹ 7 گرام + پانی 83 ملی لیٹر = 100 گرام
سوڈیم ایزائیڈ 4 گرام + پانی 96 ملی لیٹر = 100 گرام

نمبر 5 ایسی ٹون پر آکسائیڈ

یہ ہمارہ پٹاشی کے بارودوں میں بارود ہے ایسی ٹون پر آکسائیڈ کو درجہ ذیل عناصر اور تناسب سے تیار کریں گے ہائیڈروجن پر
آکسائیڈ خالص ہو تو تناسب 30% کی مقدار میں ہوگی
مقدار 1: ایسی ٹون + ہائیڈروجن پر آکسائیڈ + گندھک کا تیزاب

2T o 5ml + 50ml + 30ml

مقدار 2: اگر 1546H202 سے 2546 تک خالص ہونے کی صورت میں تناسب ایسی ٹون +

ہائیڈروجن پر آکسائیڈ + گندھک کا تیزاب

1ml + 10ml + 10ml

(نوٹ) گندھک کے تیزاب کی جگہ تک کا تیزاب (HOL) بھی ڈال سکتے ہیں لیکن H_2SO_4 بہتر
ہے اگر 25% خالص ہو تو تیزاب 1ml ڈالیں گے اگر 20% ہو تو تیزاب 3ml ڈالیں گے اگر 15% ہو
تو 5ml ڈالیں گے

مقدار 3: ایسی ٹون + ہائیڈروجن پر آکسائیڈ + نمک کا تیزاب

2T o 5ml + 30ml + 10ml

طبعی خواص

1. یہ سفید رنگ کے ذرات ہوتے ہیں جو کورڈ، چوٹ، حرارت اور 1 قطرہ (H_2SO_4) سے پھٹ جاتا ہے (اس کو چارٹ
میں H_2SO_4 کے کپھول سے بھی پھٹایا جاسکتا ہے)
2. یہ کمرے کے درجہ حرارت پر گیس میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور بخارات بن کر ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔
3. یہ پانی میں حل نہیں ہوتا ہے اسلئے ہم اسکو پانی میں استور کرتے ہیں۔
4. اس کا سالمی وزن 118 ہے اور اس کے پھٹنے کی رفتار 53000 میٹر فی سیکنڈ ہے۔

5. یہ جوٹ سے زیادہ حساس ہے اور 88 ڈگری پر پھٹ جاتا ہے۔

6. یہ پھول گھوڑا نام اور اسی ٹون میں مل جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کیلئے ان میں مل کرتے ہیں اور دوبارہ حاصل کرنے کے لئے اس میں پانی ملاتے ہیں کہ اسی ٹون پر آکسائیڈ پیچھے بیچ جائے پانی درمیان میں اور پھول وغیرہ اوپر کی سطح پر آجائے۔

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ تیاری کے مراحل ☆☆☆☆☆

ہمیں H202 تین طرح کی ملتی ہے تینوں کی مقداریں علیحدہ ہیں ان کیلئے ہم مقدار نمبر 1.30% والی ہم اسے بتائیں

1. ایک بیکر میں 50ml H₂O₂ لیں اور اس میں آہستہ آہستہ 30ml ایسی ٹون ملائیں

اب اس ٹیکر کو ریف میں رکھیں اور اس کا درجہ حرارت 5c تک لیں آئیں۔

2. اب اس میں قطروں کی صورت میں 25 ملی لیٹر H_2SO_4 ڈالیں لیکن خیال رہے کہ درج حرارت 5°C سے 10°C تک ہو۔ اور مسلسل ہلاتے رہیں۔

3. جب تمام غصہ مٹس ہو جائے تو اس کو عرف والے برتن سے نکال لیں اور اس کو 5 سے 7 منٹ تک ہلائیں۔

4. اب اس مکچر کو 8 گھنٹے سے 24 گھنٹے تک 5 سے 8 ڈگری تک فریج میں رکھیں (برف والے خانے میں نہیں بلکہ ٹھنڈے

خانے میں رکھیں) 24 گھنٹے کے بعد سفید رنگ کے ذرات بن جائیں گے ان کو

فلٹر کریں۔ سادہ پانی سے دھولیں اور پھر ان کو 20% والے سوڈیم کاربونیٹ سے دھولیں۔

5. ان کو سایہ دار یا کمرے میں فلٹر کریں اور خشک کر لیں (فلٹر پیپر پر ہی) یہی ایسی ٹون پر آکسائیڈ ہے۔

[illegible]

1. حاصل شدہ ایسی ٹون پر آکسائیڈ کو بہت زیادہ 20% والے مخلول سے دھو لیں کیونکہ یہ تیزاب سے بہت حساس ہوتا ہے۔

2. تیاری کے دوران آگ، یا حرارت سے دور رکھیں۔

3. خشک حالت میں اس کو 30 سے 35 ڈگری تک 18 گھنٹے تک رکھ سکتے ہیں۔

نوٹ) اگر دوران تیاری اس کا درجہ حرارت 60c تک ہو جائے تو اس کو نو رامنڈے پانی میں اضمحیل دیں

1. ایک ماچس کی ڈبیہ سے ہنتر تریا ایک گرام پونا شیم کلورین متبادل حاصل کر سکتے ہیں۔
2. ایک بڑا اور کھلے منہ والا برتن لیں اس کو آدھا پانی سے بھر دیں اب اس میں ماچس کی تیلیاں ڈالیں پانی کو پالیں تاکہ تیلیوں کے سر سے لگا ہوا مصالطہ طحہ ہو جائے۔
3. اب اس میں سے بیکارنگریاں نکال لیں اور پانی کو گرم کرتے رہیں یہاں تک کہ وہ مکڑی کی طرح ہو جائے۔
4. اب اس کو فلٹر کریں اور خالص شدہ پانی کو دوبارہ چوبے پر رکھیں۔
5. جب پونا شیم کلورین کاڑھا کچڑی کی طرح ہو جائے تو اس کو اتار کر خشک کریں۔
6. خشک ہونے پر اس کو چین لیں اور خشک کر چکدہ پر اسٹور کر لیں۔
- (نوٹ) ہو سکتا ہے کہ اس کا رنگ سرخی مائل ہو سکی پونا شیم کلورین کا متبادل ہے۔

یلو پوڈر کی خصوصیات

1. یہ گہرے سلیٹی رنگ میں ہوتا ہے اور یہ شعلہ رگڑ بھونکر سے پھٹ جاتا ہے
2. جب اس کو ڈیونیزٹر سے پھٹایا جاتا ہے تو یہ بہت زیادہ دھماکا کرتا ہے۔
3. ڈیونیزٹر کے بغیر اس کو بند ڈبے میں خانی فیوز کی مدد سے پھاڑا جاسکتا ہے۔
4. یہ بہت حساس ہے معمولی شعلہ دینے سے آگ پکڑتا ہے تاہم فیوز میں بھی استعمال ہوتا ہے۔
5. اس کے جلنے کی رفتار انتہائی تیز ہے۔ اس کو تاہم فیوز میں استعمال کرتے سے پہلے اس کی رفتار جانچ لیں
- 10.6 گرام یلو پوڈر ایک گریڈ کے برابر ہے۔ اسے ہم چوٹ والا ہم بنا سکتے ہیں۔ اس کے لئے لوہے کے بند ڈبے میں کچھ کنکریاں نوپے کے ٹکڑے ڈالیں
7. اس کو پٹائی میں برقی قلمیٹ والے یا فیوز والے سرے پر رکھا جاتا ہے تاکہ پٹائی بارود کو زیادہ شعلہ دے سکے

یلو پوڈر کی تیاری

- 25.1 گرام سلفر کا اچھی طرح پس لیں چھان لیں۔ اور اب اس میں 25 گرام امونیم پوڈر کو رکس کریں۔
2. اب پونا شیم کلورین کو چٹکے اور بلیکن کی مدد سے باریک پس لیں اور چھان لیں۔
3. دونوں کچڑوں کو پس میں اچھی طرح ملائیں۔ یلو پوڈر تیار ہے

پونا شیم کلوریٹ کس نمبر 2

وائٹ پوڈر

اس میں استعمال ہونے والے اجزاء ہندوچہ ذیل ہیں

(a) پونا شیم کلوریٹ + کوئک + گندھک

12.5% 12.5% 75%

(b) پونا شیم کلوریٹ + لکڑی کا برادہ + گندھک

12.5% 12.5% 75%

خواص

1. یہ لیو پوڈر سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور اس سے کم حساس ہے یہ سیای مائل اور لکڑی کے رنگ کا ہوتا ہے
2. یہ شعلہ، رگڑ، جھوکرے پھٹتا ہے اور اس کو ڈیو نیڑ سے بھی پھٹایا جاسکتا ہے
3. اس کو ہم ساہو فیوز سے بھی پھٹا سکتے ہیں لیکن اس لئے ہم کو لوہے کا بند ڈبہ استعمال کرنا پڑے گا
4. برادہ والا وائٹ پوڈر نام فیوز میں استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ آہستہ جلتا ہے

تقابل موازنہ

لیو پوڈر • وائٹ پوڈر

1. یہ وائٹ پوڈر سے کم طاقتور ہے
2. یہ ایک ہی مقدار میں لیو پوڈر سے زیادہ طاقتور ہے
3. یہ کم آواز اور کم شعلہ پیدا کرتا ہے
4. یہ کم تیز جلتا ہے
5. یہ بہت تیز جلتا ہے
6. یہ کم تیز جلتا ہے
7. اس کے برعکس برادہ والا ایکس نام فیوز میں استعمال ہوتا ہے
8. اس کے ساتھ جلتا ہے اسلئے نام فیوز میں
9. جلدی آگ پکڑتا ہے اور تیز رفتاری
10. کے ساتھ جلتا ہے اسلئے نام فیوز میں

استعمال نہیں ہوتا ہے۔

(نوٹ) وائٹ پوڈر کا برادے والا کس آہستہ جلتا ہے جب کہ کوئلے والا کس تیز جلتا ہے

ٹائم ٹیوز اور ڈیونیزٹر کی تیاری

ٹائم ٹیوز

1. اس کے لئے ہم عام طور پر پلاسٹک کا باریک پائپ استعمال کرتے ہیں
2. پائپ کا ایک سر 45 کے زاویے پر کاٹیں اور دوسرا سر 90 یعنی گول کاٹ لیں
3. اس میں وائٹ یا بلیو پوڈر احتیاط سے بھر دیں اور استعمال کر سے پہلے اس کا ٹائم چیک کر لیں

ڈیونیزٹر - ڈیونیزٹر عام طور پر دو طرح کے ہوتے ہیں

1. برقی ڈیونیزٹر

2. شعلہ والا ڈیونیزٹر

برقی ڈیونیزٹر - اس کی آگے دو قسمیں ہوتی ہیں - سادہ اور مرکب ڈیونیزٹر

سادہ ڈیونیزٹر میں صرف ایک بارود ہوتا ہے

مرکب ڈیونیزٹر -

اس میں ایک سے زیادہ بارود ہوتے ہیں

مرکب ڈیونیزٹر سادہ ڈیونیزٹر سے طاقتور ہوتا ہے

برقی ڈیونیزٹر کی تیاری

1. اس کے لئے ہم کچھوٹے بلب یعنی 1.5v، 3v، 6v کی ضرورت ہے
2. بلب لے کر اس کا شیشہ توڑ دیں اور اندر کا فیلامنٹ بچا لیں
3. اس کو کسی بھی ڈیونیزٹر میں ڈالیں گے اور 9v کی بیٹری سے کرنٹ پاس کریں

4. برقیڈیوٹر کے فیلائٹ کو ہم ایئر فون کی تار کو سوئی پر ول کر کے بھی بنا سکتے ہیں

شعلہ والا ڈیونٹر ☆☆☆☆☆☆☆☆☆

اس کے لئے ہمیں ٹائم فووز کی ضرورت ہے

کسی بھی دھات کا ڈیونٹر بنا کر اس میں اس کے مطابق بارود ڈال کر اوپر سے ٹائم فووز سے جوڑ دیں شعلہ والا ڈیونٹر تیار ہے

آرمی ڈیونٹر کی نسبت

RDX=0.6gm ☆☆☆ سب سے نیچے

LEAD AZIDE=0.3gm ☆☆☆ تیسرے نمبر پر

MURCRY FULMINATE=0.1gm ☆☆☆ دوسرے نمبر پر

YELLOW POWDER ☆☆☆ سب سے اوپر

پوٹاشیم کلورینٹ کس نمبر 3

ٹائیٹرومین

جزا ۱- پوٹاشیم کلورینٹ + ٹائیٹرومین

20g

80g

پوٹاشیم کلورینٹ سے ہم کو اچھا تعارف ہے جب کہ ٹائیٹرومین ایک نیا عنصر ہے مارکینٹ میں میری بان آئل کے نام سے

دستیاب ہے اور بچوں کے پیٹ میں پڑنے والے کیڑوں کی دوائی بنانے کے کام آتا ہے اور یہ اچھے میڈکل سٹوریو یا کیمسٹ

سے دستیاب ہے ہم خود بھی بنا سکتے ہیں

ٹائیٹرومین کی تیاری ☆☆☆☆☆☆☆☆☆

اس کی تیاری کیلئے ہم کو مندرجہ ذیل عناصر کی ضرورت ہے

1. شورے کا تیزاب 50ml

2. گندھک کا تیز اب 50ml

3. سپر پٹرول 20ml

تیاری

1. 50ml شورے کا تیز اب ایک ٹیکر میں ڈالیں اور اس ٹیکر کو برف میں رکھیں

2. اب اس میں آہستہ آہستہ 50ml گندھک کا تیز اب ملا شروع کریں اور احتیاط کریں کہ درجہ حرارت 25 ڈگری تک

رہے

3. جب دونوں تیز ابوں کا مرکب تیار ہو جائے تو اس کا درجہ حرارت 50 ڈگری تک لیں جائیں

4. اس ٹیکر کو برف میں رکھیں اور اس میں قطروں کی شکل میں 20ml سپر پٹرول ڈالیں

(نوٹ) اس کا درجہ حرارت 40 سے 50 تک ہی رکھیں

5. جب تمام پٹرول حل ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ مخلول کی سطح پر ایک تیل کے گندھک کی تہ بن جائے گی یہی ہمارا ٹیسٹرو

بیزین ہے

6. اب سارے مرکب کو سنڈر میں ڈالیں اور ڈراپر کی مدد سے اس کو پیچھ کر لیں

(نوٹ) اگر دوران تیاری مرکب کا درجہ حرارت 75 سے بڑھ جائے تو فوراً ٹھنڈے پانی میں اٹھیل دیں ورنہ 80 ڈگری پر

چا کر دھماکہ کر دے گا

ٹیسٹرو بیزین کو خالص کرنے کا طریقہ

ٹیسٹرو بیزین کو خالص کرنے کے لئے تین فیصد سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ کے محلول سے دھوتے ہیں جب لٹمس پیپر کارنگ بنز یا

نہا ہو جائے تو اس کو پانی سے الگ کریں گے یہ ہمارا خالص ترین ٹیسٹرو بیزین ہوگا

نوٹ ☆☆☆☆

ٹیسٹرو بیزین بہت طاقت ور ذہر ہے یہ جلد سے بھی جسم میں داخل ہو سکتا ہے یہ اگر کہیں لگ جائے تو فوراً کھلے پانی سے بہت زیا

دودھ لیں

پوٹاشیم کلورائیٹ اور نائٹروجن کاہم

80gm پوٹاشیم کلورائیٹ کو اچھی طرح سے چیں کر چھان لیں؛ اسکو کسی لوہے یا پلاسٹک کی ڈبیہ میں ڈالیں اس میں پینل کی مدد سے ڈیونیز کے لئے سوراخ بنالیں 20ml نائٹروجن لیں اس کو ڈراپ کی مدد سے پوٹاشیم کلورائیٹ پر ڈالیں جب تمام نونین ڈال دیں تو اس کو سات منٹ تک رھنے دیں تاکہ یہ اچھی طرح جذب ہو جائے آپ کاہم تیار ہے اس کو گریڈ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں نائٹروجن کے ڈالنے وقت یہ خیال رکھیں کہ چاروں طرف نائٹروجن پوٹاشیم کلورائیٹ میں جذب ہو جائے تاکہ ہر جگہ پختی کراچھی طرح تیار ہو جائے اس مکس کو ہوا بند پلاسٹک یا لوہے کی ڈبیہ میں رکھیں تاکہ اس میں سے نائٹروجن نکلے۔

طبعی خصوصیات ☆☆☆☆☆☆☆☆

1. یہ گاڑے اور سخت کچڑ کی طرح کا کم حساس بارود ہے۔
 2. یہ ڈیونیز سے پھنایا جاسکتا ہے اور اس کے پھٹنے کی رفتار درمیانی ہے۔
 3. اس کو ہم نیورڈائٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔
 4. اس کا 100gm کا مکس چارٹی لیٹر موٹی لوہے کی چادر میں بیس بی لیٹر قطر کا سوراخ بنا سکتے ہیں جبکہ اتنی مقدار میں TNT اتنا بڑا سوراخ نہیں بنا سکتا۔
 5. اس کو رادھفوز سے بھی پھنایا جاسکتا ہے لیکن اس کے لئے ہم چینی کا استعمال کرتے ہیں اور ان کی مقدار مندرجہ ذیل ہے۔
- پوٹاشیم کلورائیٹ + نائٹروجن + چینی جیسی ہوئی
- 30gm + 20gm + 50gm

مکس نمبر 4 قذافی بم ☆☆☆☆☆☆

اجزاء ☆

پوٹاشیم کلورائیٹ + وپرلین + انجن آئل
88gm + 12gm + پانچ سے دس قطرے

تیاری

پوٹاشیم کلورائیڈ کو اچھی طرح چیس لیں اور چھانسنے کے بعد دستانے پہن کر ویزلین میں آٹے کی طرح گوند لیں اب اس میں پانچ سے دس قطرے آجین آئل ڈال دیں غذائی بم تیار ہے یہ بوسٹر چارج سے بچنے کا اسلئے اس کے ڈیونیزٹر کے ارد گرد وایت یا بیلو پاؤڈر ڈالیں اور کوئی زیادہ حساس بارود (نوٹ) اس کو از پورٹ پر چیک کرنا مشکل ہے ایسیا کے کرئل غذائی نے امریکہ کے خلاف یہی بم استعمال کیا تھا

مکس نمبر 5☆☆☆☆

پوٹاشیم کلورائیڈ + سلفر + چینی + ویزلین
15gm + 15gm + 35gm + 35gm
(نوٹ)
چینی کو باریک چیس لیں خالی ڈیونیزٹر سے بچنے کا بوسٹر کے بغیر

مکس نمبر 6☆☆☆☆☆

پوٹاشیم کلورائیڈ + المونیم + چینی یا ڈیزل
10gm + 10ml + 5gm + 85gm
(نوٹ)
چینی باریک چیس لیں ورنہ بم نہیں بچے گا یہ پٹاشی کے بغیر بھی تاہم ٹیوز سے پھٹ سکتا ہے
پوٹاشیم کلورائیڈ + سلفر
11% + 1%

دونوں عناصر کو اچھی طرح چیس لیں اور چھانسنے کے بعد مکس کریں اس کو پٹاشی اوپنر پٹاشی کے پھٹایا جاسکتا ہے بغیر پٹاشی کے پھٹانیکے لئے اس کو لوہے کے ڈبے میں بند کریں

مکس نمبر 8☆☆☆☆☆

پوٹاشیم کلورائیڈ + المونیم پاؤڈر + کافی + چینی

5gm+ 10gm +15gm +70gm

نمبر 8 امونیم ٹائٹریٹ

1. یہ ایک کھاد ہے۔ جس کو عرف عام میں گوارہ کھاد کہتے ہیں امونیم ٹائٹریٹ کھاد کا رد عمل بہت ست ہے۔ اس لئے ہم ڈیوٹریٹ کے ارد گرد کچھ مقدار میں وائٹ پوڈر ڈالتے ہیں اس کے تمام کس پوڈر چارٹ نے چھتے ہیں

2. امونیم ٹائٹریٹ نمی کو جلد جذب کرتا ہے اگر یہ غم ہو تو اس کو ہم ہاٹ سینڈ ہاتھ دیتے ہیں یعنی ایک برتن میں ریت گرم کر کے ہم دوسرے برتن میں امونیم ٹائٹریٹ ڈال کر ریت والے برتن میں رکھتے ہیں۔
تو گرم ریت کی حرارت سے کھاد شکل ہو جاتی ہے

امونیم ٹائٹریٹ کے مکس

نمبر (1) امونیم ٹائٹریٹ + گندھک + امونیم پوڈر

10g+ 5g+ 85g+

نمبر (2) امونیم ٹائٹریٹ + ڈیریل

9 گرام + 1 لیٹر

امونیم ٹائٹریٹ کو مکمل شکل کریں اور سفوف کی شکل دے کر اس میں ڈیریل ملائیں اس کی رفتار 34000 میٹر فی سیکنڈ ہے

نمبر (3) امونیم ٹائٹریٹ + امونیم پوڈر

4 گرام + 1 گرام

نمبر (4) امونیم ٹائٹریٹ + امونیم پوڈر + کافی

2%+ 2%+ 6%+

نمبر (5) امونیم ٹائٹریٹ + امونیم پوڈر + کوئلہ

5g+ 15g+ 80g+

نمبر (6) امونیم ٹائٹریٹ + جینی یا برادہ

تو گرام + ایک گرام

نوٹ) امونیم ٹائٹریٹ کو کسی لوہے کے ڈبے میں تھوڑا سا امونیم پوڈر ملانے کے بعد سینڈ ہاتھ دے کر پکایا جاسکتا ہے

اور ٹھنڈا ہونے پر یہ شوش شکل میں جم جاتا ہے اس کو ٹائٹریٹ سلیب کہتے ہیں۔

☆ نمبر 9 یوریا ٹائٹریٹ ☆

خواص

1. یہ سفید رنگ کے ذرات ہیں جو آسانی سے پانی میں حل ہو جاتے ہیں
2. آگراں میں نمی ہو تو نہیں پختے ہیں
3. یہ خود بھی چارٹ ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ ہم اس کو کس کر کے استعمال کریں

یوریا ٹائٹریٹ کی تیاری

یوریا 100 گرام شورے کا تیزاب 135 ملی لیٹر پانی 150 ملی لیٹر

طریقہ ☆ ☆

1. یوریا 100 گرام لیں اور اسے 150 ملی لیٹر پانی میں حل کریں
2. جب یہ پانی میں حل ہو جائے تو اس میں آہستہ آہستہ 135 ملی لیٹر شورے کا تیزاب ملائیں اب اس میں فوراً یوریا ٹائٹریٹ بنی دیکھیں گے
3. اب اس محلول کو 2 گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں تاکہ کرسٹل اچھی طرح بن جائیں
4. اس کے بعد انہیں فلٹر کریں اور ہوا میں مکمل طور پر خشک کریں
5. خشک ہو چائے تو تھیں لیں اور چھان لیں اور بطور چارٹ محفوظ کریں

یوریا ٹائٹریٹ حاصل کرنے کا طریقہ نمبر 2

1. دس کپ انسانی یا حیوانی پیشاب لیں اور اسے بالیس حتی کے یہ ایک کپ رد جائے
2. اب اس محلول کو فلٹر کریں باقی حاصل شدہ محلول میں آدھا کپ شورے کا تیزاب ڈالیں اور اس کو دو گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں تاکہ ذرات بننا شروع ہو جائیں

3. اس کے بعد اس کو دوبارہ فلٹر کریں اور اس مواد اور سایہ دار جگہ میں خشک کریں یہ پوریاٹائیٹرٹ ہے

پوریاٹائیٹرٹ کے کس

پوریاٹائیٹرٹ + امونیم ٹائیٹرٹ + امونیم پوڈر

نمبر 1 حصہ 2 حصہ 6 حصہ 1 حصہ

نمبر 2 حصہ 3 حصہ 3 حصہ 1 حصہ

نمبر 3 حصہ 4 حصہ 2 حصہ 1 حصہ

نمبر 4 حصہ 4 حصہ 1 حصہ

نمبر 5.6 حصہ 2 حصہ 1 حصہ

نمبر 6 حصہ 4 حصہ 1 حصہ 1 حصہ

نمبر 7 پوریاٹائیٹرٹ 3 حصے + امونیم پوڈر 1 حصہ + گندھک 1 حصہ

(نوٹ) یہ تمام کس ٹی این ٹی سے زیادہ طاقتور ہے ان تمام سکوں کو پختانے کیلئے بوسٹر چارج کی ضرورت ہے اس کے لئے

ڈیٹریٹر کے ارد گرد وائٹ یا یلو پوڈر ڈالیں گے

نمبر 8 پوریاٹائیٹرٹ 4 حصے + امونیم پوڈر 1 حصہ + کان 1 حصہ

نمبر 10 بلیک پوڈر

اجزاء

پوٹاشیم ٹائیٹرٹ + سلفر + کاربن (کونک)

75% 10% 15%

اس کو عام طور پر گولیوں اور بڑے گولوں میں دھکیلنے والے ہارڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں

تیاری ☆☆☆

1. پوناٹیم ٹائٹریٹ کوئلہ اور سلفر کوئلہ دیکھو اچھی طرح پس لیں اور چھان لیں
2. پہلے سلفر اور کوئلہ کو آتش میں ملائیں اور اس کے بعد پوناٹیم ٹائٹریٹ کو اس میں مکس کریں بلیک پوڈر تیار ہے۔

☆ ☆ ☆ بلیک پوڈر کا کس

اجزاء

1. بلیک پوڈر + میکینیشم پوڈر

50% 50%

2. بلیک پوڈر + المونیم پوڈر

20% 80%

☆ ☆ ☆ خواص

1. یہ چاشنی اور ٹائم فیلز دونوں سے پٹایا جاتا ہے۔ بغیر ڈیٹونیٹر پٹانے کیلئے لوہے کے بند ڈبے میں استعمال کرنا ہوگا
2. بلیک پوڈر بڑی تیزی سے جلتا ہے اور میکینیشم پوڈر کی موجودگی میں بہت زیادہ گیس پیدا کرتا ہے۔

☆ ☆ ☆ بلیک پوڈر بنانے کا طریقہ نمبر 2

پہلے والے طریقہ میں بہت سی کثافتیں رہ جاتی ہیں ان کو دور کرنے اس کو FRENCH HOT METHOD سے بناتے ہیں

☆ ☆ ☆ تیاری

اس طریقے میں اجزاء کا تناسب اور مقدار وہی ہے جو کہ پہلے طریقے میں ہے۔

1. ایک ٹیکر میں 22ml ڈسلفائیڈ واٹر لیں اور اس میں تمام اجزاء ڈال دیں اب اس کو ہینر پر رکھیں اس میں پہلے شروع ہو جائیں گے مگر ابلیے نہیں
2. دوسرے ٹیکر میں 764ml تھیل الکول لیں اور اس کو کھلول والے ٹیکر میں حل کریں اور کچھ دیر تک اچھی طرح ہلائیں

3. اب حرارت ختم کریں اور صاف کپڑے میں فلٹر کریں اور نچوڑ لیں اور سکھا لیں
4. اگر اسے ہلکا بنانے والا پوڈر چاہیے تو موٹی چھلکی سے چھان لیں بلیک پوڈر چاہیے تو باریک چھلکی سے چھان لیں

نمبر 11 پوٹاشیم پر میگنیٹ

اس کو عام طور پر لال دوائی یا بنگی کہتے ہیں اور عام دستیاب ہے۔ اس کا رد عمل سست ہے۔ یہ بہت زیادہ گیس بناتی ہے۔ اس کو پوٹر چارج کے ذریعے پختا ہے اس کے کس بہت طاقتور ہیں

پوٹاشیم پر میگنیٹ کے کس

1. پوٹاشیم پر میگنیٹ + المونیم پوڈر

60% 40%

2. پوٹاشیم پر میگنیٹ + المونیم پوڈر + چینی

50% 25% 25%

نمبر 12 آر۔ ڈی۔ ایکس

RDX کے طبی خواص

1. یہ فیورنگ کے ذرات ہوتے ہیں
2. یہ پانی میں حل نہیں ہوتے لیکن گرم ہنرین اور ایسی ٹون میں حل ہو جاتے ہیں
3. اس کو کیوٹ ڈیوٹریٹر میں پوٹر کے طور پر مرکری فلیٹ اور ایڈائیٹس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں
4. یہ آگ سے جلتا ہے مگر 170 ڈگری پر پختا ہے

RDX کی تیاری ☆☆☆

طاقتور شورے کا تیزاب + ہیکسامین + پانی (صاف اور خشک)

خالص 120ml 98% 70gm+ 750ml+

☆ ☆ ☆ طریقہ کار ☆ ☆ ☆

1. 120.1 لیٹر شورے کا تیزاب ایک بیکلر میں ڈالیں بیکلر کا درجہ حرارت 20c سے بیکلر 30c تک رکھیں درجہ حرارت کو گرم اور ٹھنڈے پانی سے کنٹرول کریں
2. 70.2 گرم میکسائین لیں اور اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے تیزاب میں ملا شروع کریں
3. درجہ حرارت کا خصوصی طور پر خیال رکھیں اور یہ صرف 20c سے 30c تک ہی رکھیں
4. اگر اس میں 10 منٹ کے بعد بجورے رنگ کے بخارات نکلتا شروع ہوں تو ان کو ٹھنڈے دیں وگرنہ اس کو مزید گرم کریں کہ اس میں سے بجورے رنگ کے بخارات نکلتا شروع ہوں
5. اس کے بعد پھر اس میں 750 لیٹر گرم ایسی ٹون ڈالیں اور آپ دیکھیں گے کہ کافی سفید رنگ کے ذرات بن جائیں گے۔

6. اب ان کٹلر کریں اور اس کو 2% محلول سے اچھی طرح دھو لیں

7. PH پیر (ٹیس پیپر) کے چیک کرنے کے بعد اس کو دوبارہ فیلٹر کریں

8. اس کو مزید خالص کرنے کیلئے 650 لیٹر گرم ایسی ٹون ڈالیں اور یہ بالکل اس میں حل ہو جائے گا اور بعد میں ٹھنڈا پانی

ڈالیں تو اس میں دوبارہ ذرات بن جائیں گے جو کہ بالکل خالص ہوتے ہیں

9. اس محلول کو فیلٹر کریں اور خشک جگہ پر سکھائیں اور اسٹور کر لیں

(نوٹ) RDX کی تیاری کے لئے ضروری ہے کہ شورے کا تیزاب 98% خالص ہو

☆ ☆ ☆ ☆ نمبر 13 نائٹرو گلیسرین ☆ ☆ ☆ ☆

اس میں جو عناصر استعمال ہوتے ہیں اور اس سے جو کس بنتے ہیں وہ چارٹ اور چٹائی کے بارودوں سے کم حساس ہے لیکن ان سب سے زیادہ طاقتور ہے نائٹرو گلیسرین نائٹرو گلیسرین زراحتہ ساتھ بغیر دھویں والی ٹیوز بنانے کے کام آتی ہے

☆ ☆ ☆ خواص ☆ ☆ ☆

1. جب یہ خالص ہوتی ہے تو بے رنگ ہوتی ہے لیکن عام طور پر کچھ رنگ یا کریم کلمر میں ہوتی ہے۔

2. یہ 11 سے 13 ڈگری مٹی پر جم جاتی ہے۔

3. یہ پانی میں حل نہیں ہوتی لیکن زیتون کے تیل، الگول، کلوفارم، ہائیڈروکربن میں حل ہو جاتی ہے۔
 4. اس کا سالمی وزن 1.6 ہے۔
 5. جب اس میں H_2SO_4 ڈالیں تو اس کے اجزاء الگ الگ ہو جاتے ہیں۔
 6. اس میں دوسری بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں۔
 7. 75c پر بھی اس کے اجزاء الگ ہو جاتے ہیں۔
 8. جب اس کو 180c تک گرم کیا جائے تو یہ گیس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔
 9. یہ چوٹ سے حساس ہے لیکن بھی ہوئی حالت میں کم حساس ہے۔
 10. اس کو گولی مار کر بھی پھنسا یا جاسکتا ہے اور یہ چینی کے برتن کے کناروں اور اوزاروں کی وار سے پھٹ سکتی ہے اور دباؤ سے بھی پھٹ سکتی ہے۔
 11. یہ جب مائع شکل میں ہو تو اس کی پھٹنے کی رفتار 800 سے 1000 فی سیکنڈ ہے۔
 12. ہم اس کو پانی میں مندرجہ ذیل طریقہ پر اسٹور کرتے ہیں۔
- پانی 75% + نیٹرو گلیسرین 25%
13. یہ بہت طاقتور زہر ہے اور اس کے کتنے سے بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے ☆ دروازوں، ٹانگوں میں ورم ہو جاتا ہے اگر کوئی اس سے متاثر ہو تو مریش کو راتاً رات زہر میں لے جائیں اور کیفین کا انکشن ☆ کے ساتھ ملا کر لگائیں یا بھرہ تھامین سیرپ ملائیں تو وہ بیچ سکتا ہے
 14. جن افراد کو کم مقدار میں دی جائے تو وہ اس کے مکمل عادی ہو جاتے ہیں۔ اور جو اس کے ساتھ بہت کام کرتے ہیں تو وہ بھی عادی ہو جاتے ہیں۔
 15. یہ تازہ دہنی ہو تو بہت طاقتور ہوگئی۔
 16. جب اس کو خالص حالت میں ٹھنڈی جگہ پر اسٹور کرتے ہیں تو اس سے طاقتور اور دیر پا ڈائنامائٹ بنائے جاسکتے ہیں۔

☆ ☆ ☆ نیٹرو گلیسرین کی تیاری ☆ ☆ ☆

اس میں اجزاء مندرجہ ذیل تناسب اور مقدار میں استعمال ہوتے ہیں۔

گندھک کا تیزاب + شورے کا تیزاب + گلیسرین

5ml+ 15ml+ 22.5ml

شورے اور گندھک کا تیزاب عام دستیاب ہے اور گلسرین کو ہم گھی سے حاصل کر سکتے ہیں۔
گھی کو 25c تک گرم کریں اور اس میں NaOH اور KOH کی تھوڑی سی مقدار ڈالیں۔ اب اس کو مسلسل
ہلائیں یہاں تک کہ گھی دو حصوں میں تقسیم ہو جائے اوپر والا دو دھیا رنگ میں جم جائے اور سخت ہو جائے جب کہ نیچے والا مائع
گلسرین ہوگا اور اس وقت تک گھی میں NaOH یا KOH ڈالتے رہیں جب تک یہ علیحدہ نہ ہو جائے۔

تیار کرنے کے مراحل ☆☆☆☆

1. ایک بیکر میں 15ml شورے کا تیزاب ڈالیں اور بیکر کو ریف میں رکھیں اور اس میں 22.5ml گندھک کا تیزاب
ڈالیں اور درجہ حرارت 25 ڈگری پر برقرار رکھیں۔
2. اب اس محلول کا درجہ حرارت 12 تک لے جائیں اور اس میں قطروں کی صورت میں گلسرین ڈالنا شروع کر دیں
3. درجہ حرارت ہر صورت میں 15 سے 30 ڈگری تک ہو جائے آگ اس کا درجہ حرارت 50c سے 60c تک چلا گیا تو
فورا پانی میں ڈال دیں
4. جب تمام گلسرین حل ہو جائے تو اس محلول کو 10 منٹ تک ہلائیں
5. اب اب محلول کو 250ml پانی میں ڈال دیں اب آپ بیکر میں ناخیر و گلسرین ☆☆☆☆

ناخیر و گلسرین ☆☆☆☆☆

ناخیر و گلسرین ہمیں حاصل ہوئی وہ اب تک اپنی تیزاب کی وجہ سے غیر محفوظ ہے اس لیے ضروری ہے اس کو خالص کی جائے اس
لئے ہم اس کو 2% والے محلول میں ڈالیں یہاں تک کہ PH پیپر کارنگ سبز یا نیلا ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ ناخیر و گلسرین
تیزاب ہے پاک ہو گئی

ناخیر و گلسرین کے کس

کس 1. ڈائنامائٹ

ڈائنامیٹ ایک نرم عنصر ہے + جو کہ بہت رنگوں میں پایا جاتا ہے یہ ٹائرو گلسرین کے دوسرے ملنے سے بنتا ہے
+ TNT سے زیادہ حساس ہے

اگر اس کو لیے عرصے تک سنور کیا جائے تو اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے
یہ بھاری ضرب سے پھٹتا ہے اس کی پھٹنے کی رفتار 4 سے 7 میٹر فی سیکنڈ ہے یہ مندرجہ چیزوں سے بنتا ہے
گلسرین + سوڈیم نائٹریٹ + سوڈیم کاربونیٹ + برادہ

24.3 52.9% 0.9% 21.9%

ٹائرو گلسرین حساس ہے اس لئے ملائے وقت احتیاط کی ضرورت ہے جن عناصر کو پینے کی ضرورت ہے ان کو پین اور چھان
لیں پہلے سوڈیم نائٹریٹ اور برادہ کو ملائیں اور بعد میں سوڈیم کاربونیٹ کو ملائیں اب ڈراپر کی مدد سے قطرہ قطرہ ٹائرو
گلسرین اس میں ملائیں اس کو ہاتھ سے اچھی طرح مکس کر لیں ڈائنامیٹ تیار ہے

اگر اس میں سوڈیم کلورائیڈ یا ملٹلر شامل کیا جائے تو اس کی طاقت بڑھتی ہے ڈائنامیٹ کو 15c سے 40c تک اسٹور کرتے
ہیں اگر دیر حرارت بڑھ جائے تو ٹائرو گلسرین دوسرے عناصر سے الگ ہو جاتی ہے جو کہ بہت خطرناک ہے
مکس نمبر 2 ٹائرو گلسرین + امونیم آکسائیڈ + سوڈیم نائٹریٹ + برادہ

30%+ 30% 20%+ 10%+ 10%+
مکس نمبر 3 ٹائرو گلسرین + سوڈیم نائٹریٹ + برادہ

26% 33%+ 41%+ +

مکس نمبر 4 ٹائرو گلسرین + سوڈیم نائٹریٹ + امونیم آکسائیڈ + برادہ
35%+ 37%+ 1%+ 27%+

نمبر 5 ٹائرو گلسرین + پوٹاشیم نائٹریٹ + برادہ + امونیم آکسائیڈ + سوڈیم نائٹریٹ + ٹائرو سیلیولوز
33%+ 26%+ 10%+ 3%+ 27%+ 1%+

نمبر 6 ٹائرو گلسرین + نشاستہ (STARCH) + ٹائرو سیلیولوز +
47%+ 50%+ 3%+

نمبر 7 ٹائرو گلسرین + سوڈیم نائٹریٹ + برادہ + پوٹاشیم کلورائیڈ
30%+ 22.3 40.5%+ 7.2%+

نمبر 8 ٹائٹرو گلیسرین + ہیرٹیم ٹائٹریٹ + سوڈیم کاربونیٹ + برادہ

28% 32% 2% 38%

نمبر 9 ٹائٹرو گلیسرین + پوٹاشیم ٹائٹریٹ + کیلشیم کاربونیٹ + برادہ + امونیم آکسائیڈ + ہیرٹیم ٹائٹریٹ

23% 26% 5% 37% 5% 4%

نمبر 10 ٹائٹرو گلیسرین + ٹائیزوسلیوز + امونیم ٹائٹریٹ

12% +0.5% 87.5%

نمبر 11 جلائین مکس

ٹائٹرو گلیسرین + ٹائیزوسلیوز + امونیم ٹائٹریٹ

24% + 1% + 75%

نمبر 12 ٹائٹرو گلیسرین + ٹائیزوسلیوز + امونیم ٹائٹریٹ + برادہ + امونیم آکسائیڈ + سوڈیم کلورائیڈ

9.5% + 0.5% + 59% + 6% + 10% + 15%

نمبر 13 ٹائٹرو گلیسرین + ٹائیزوسلیوز + برادہ + پوٹاشیم ٹائٹریٹ

75% + 5% + 5% + 15%

نمبر 14 ٹائٹرو گلیسرین + ٹائیزوسلیوز + امونیم ٹائٹریٹ

(a) 29% + 1% + 70%

(b) 73.4% + 13.3% + 13.3%

(c) 70% + 4% + 23% + کوکے 3%

(d) 29% + 1% + 65% + پوٹاشیم ٹائٹریٹ 5%

(e) 75% + 5% + 15% + برادہ 5%

نمبر 12 ٹائٹرو میتھین

طبی خواص

1. یہ ایک مایا ہے جو کثرت بارود کے طور پر جاتا جاتا ہے اور اس کو عناصر میں ملانے کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے مایا مخل میں یہ کہیں بھی ڈال کر پھٹانی جاسکتی ہے اس کے مختلف رنگ اس کی طاقت کو ظاہر کرتے ہیں یہ ڈیوار اور لوہے کی شیشیوں اور کنکریٹ کے درمیان میں ڈال کر پھاڑی جاسکتی ہے
2. یہ TnT سے 25% زیادہ طاقتور ہے اس کے پھٹنے کی رفتار 6200 میٹر فی سیکنڈ ہے یہ RDX ایڑ ایڈ اور پراوکسائیڈ سے بنے ہوئے ڈیفونیٹر سے پھٹتی ہے
3. یہ آسانی سے بخارات میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس لئے اس کو پانی کے نیچے شور کرتے ہیں۔

تیاری ☆☆☆☆

میتھانول 13.5ml

شورے کا تیزاب 16.5ml

گندھک کا تیزاب 24ml

پانی 200ml

- نمبر 1 ایک بیکر میں 16.5 ملی لیٹر شورے کا تیزاب ڈالیں۔ اس میں وقفے وقفے کے بعد 24 ملی لیٹر گندھک کا تیزاب ڈالیں اور درجہ حرارت 20 سے 25 ڈگری تک برقرار رکھیں۔
- نمبر 2 اب درجہ حرارت کو 5 سے 10 ڈگری تک لے آئیں اور اس میں 13.5 میتھانول قطروں کی صورت ڈالیں (نوٹ) اگر محلول کا درجہ حرارت 35c تک چلا جائے تو اس کو فوراً ٹھنڈے پانی میں رکھیں۔
- نمبر 3 جب تمام میتھانول اس میں حل ہو جائے تو اس کو 200ml ٹھنڈے پانی میں ڈال کر ایک منٹ تک ہلائیں۔
- نمبر 4 اب آپ کو بیکر کی تہہ میں بے رنگ علیحدہ لائن نظر آئے گی یہی مائٹرڈ میتھین ہے۔
- نمبر 5 اب اس میں موجود پانی کو بہادیں اور دوبارہ پانی سے دھو لیں۔

مائٹرڈ میتھین کے مکس ☆☆☆☆

نمبر 1 مائٹرڈ میتھین + کلری کا بارود

94% + 6%

نمبر 2: میٹرڈ مٹھیں + امونیم ہائیڈروآکسائیڈ

80% + 20%

نمبر 3: میٹرڈ مٹھیں + میٹرڈ سیلیوز

5 گرام + 8 گرام

نمبر 4: میٹرڈ مٹھیں + ایٹین

80% + 20%

نمبر 5: میٹرڈ مٹھیں + اٹھل ڈائنامیٹ

95% + 5%

(نوٹ) اٹھل ڈائنامیٹ کو ملاتے وقت میٹرڈ مٹھیں کو برف میں رکھیں۔ یہ ایک رنگ مانع بنے گا۔

☆ ☆ ☆ خصوصی احتیاط ☆ ☆ ☆

(1) جب ہم تمام مٹھیاؤں کو تیز ایوں میں جل کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کو ایک منٹ تک برف میں رکھیں اور بلا لیں۔

(2) اس کو کبھی بھی گرم نہ کریں اگر غلطی سے ہا ہرہ جائے تو یہ کمرہ کے درجہ حرارت تک گرم ہو کر اس کو فرش پر گرایا جائے تو یہ دھماکے سے پھٹ جائے گی اس لئے اگر یہ گرم ہو تو اس کو بڑی احتیاط سے فریج میں رکھیں اس کو جھکا لگ گیا تو پھر بھی پھٹ سکتی ہے۔

(3) یہ بہت طاقتور زہر ہے اس کو ننگے ہاتھوں سے نہ چھوئیں اور جن آلات میں بنائی گئی ہو ان کو بھی ننگے ہاتھوں سے مت چھوئیں کیوں کہ یہ جلد کو متاثر کرتی ہے اور 38 گھنٹے بعد تکلیف سے مارتی ہے

نمبر:- 15 نائٹرو سیلیوز

یہ ایک انچنگ چارٹ ہے جو کراکٹ اور میزائل کو لیے فاسیلے تک دھیلنے کے کام آتا ہے۔ یہ بلیک پوڈر اور اس کے کس کے ساتھ کام کرتا ہے۔ روئی کو نائٹرو سیلیوز کی سب سے اہم پیداوار کہا جاتا ہے۔ یہ آرمی بھی تیار کرتی ہے اور اسے بغیر دھویں

والا پوڈر بناتے ہیں

نمبر 2: میٹرڈ مٹھیں + امونیم ہائیڈروآکسائیڈ

80% + 20%

نمبر 3: میٹرڈ مٹھیں + میٹرڈ سیلیوز

5 گرام + 8 گرام

نمبر 4: میٹرڈ مٹھیں + ایٹالین

80% + 20%

نمبر 5: میٹرڈ مٹھیں + 7 تھل ڈائنامیٹ

95% + 5%

(نوٹ) 7 تھل ڈائنامیٹ کو ملا تے وقت میٹرڈ مٹھیں کو برف میں رکھیں۔ یہ ایک رنگ مانع بنے گا۔

☆☆☆ خصوصی احتیاط ☆☆☆

(1) جب ہم تمام مٹھانوں کو تیز ایوں میں جل کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کو ایک منٹ تک برف میں رکھیں اور ہلائیں۔

(2) اس کو کبھی بھی گرم نہ کریں اگر غلطی سے ہا ہرہ جائے تو یہ کمرہ کے درجہ حرارت تک گرم ہو کر اس کو فرش پر گرایا جائے تو یہ دھماکے سے پھٹ جائے گی اس لئے اگر یہ گرم ہو تو اس کو بڑی احتیاط سے فریج میں رکھیں اس کو جھکا لگ گیا تو پھر بھی پھٹ سکتی ہے۔

(3) یہ بہت طاقتور زہر ہے اس کو ننگے ہاتھوں سے نہ چھوئیں اور جن آلات میں بنائی گئی ہو ان کو بھی ننگے ہاتھوں سے مت چھوئیں کیوں کہ یہ جلد کو متاثر کرتی ہے اور 38 گھنٹے بعد تکلیف سے مارتی ہے

نمبر:- 15 نائٹرو سیلیوز

یہ ایک انچنگ چارج ہے جو کراکٹ اور میزائل کو لیے فاسیلے تک دھکیلنے کے کام آتا ہے۔ یہ بلیک پوڈر اور اس کے کس کے ساتھ کام کرتا ہے۔ روئی کو نائٹرو سیلیوز کی سب سے اہم پیداوار کہا جاتا ہے۔ یہ آری بھی تیار کرتی ہے اور اسے بغیر دھویں

والا پوڈر بناتے ہیں

سیلیوز کے خواص ☆☆☆

1. یہ صنوبر کی لکڑی میں کثرت سے پایا جاتا ہے اور بنزیوں، روئی اور لکڑی میں بڑے حصوں کی صورت میں ملتا ہے
2. سیلیوز گھلوز میں بھی پایا جاتا ہے کیونکہ گھلوز اس کی عمل تحجیر سے بنایا جاتا ہے

ٹائٹرو سیلیوز کے خواص

1. یہ 617 ڈگری سینٹی گریڈ پر جا کر پگھلتی ہے۔ اس کا سائسی وزن 16 ہے
2. یہ ایسی ٹون، الکحل، پرفیومز میں حل ہوتی ہے۔ جبکہ ٹائٹرو گلیسرین کے ساتھ بلیئر دھویں والا پوڈر بناتی ہے
3. جتنی پرانی لکڑی کے ساتھ ہم ٹائٹرو سیلیوز بنائیں گے اس کے جلنے کی رفتار اتنی کم ہوگی اور بنانے کے لئے درجہ حرارت کی ضرورت ہوگی

4. یہ 180 سے 185 ڈگری پر جا پگھلتا ہے

تیاری:

اس میں جواز ادا استعمال ہوتے ہیں ان کی مقدار اور تاب حسب ذیل ہے

میڈیکل روئی 17gm

شورے کا تیزاب 150ml

گندھک کا تیزاب 250ml

1. 150 ملی لیٹر شورے کا تیزاب میں 250 ملی لیٹر گندھک کا تیزاب ملائیں اور درجہ حرارت 20 سے 30 ڈگری تک

برقرار رکھیں

2. اب اس میں 17 گرام میڈیکل روئی کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں صورت ملائیں

3. اس کو سنیرنگ راڈ کی مدد سے مسلسل ہلاتے رہیں۔ اور درجہ حرارت 25 سے 30 ڈگری تک برقرار رکھیں

4. جب روئی مکمل طور پر تیزاب میں حل ہو جائے تو باقی بچے تیزاب کو ضائع کر دیں

(نوٹ) مشاہدے میں آیا ہے کہ روئی کو تفریق آدھے گھنٹے کے لئے تیزاب میں رکھیں تاکہ اس کی مائیکریشن پوری ہو۔

5. اس کے بعد روئی کو پریشر کرکس 20 تک ابالیں اور پھر کرکسنگ کر لیں۔ یہی ٹائٹرو سیلیوز ہے۔

(نوٹ) مشاہدے میں آیا ہے 2% سوڈیم کاربونیٹ سے بغیر دھوئے ٹائٹرو سیلیوز میں مائیکریشن زیادہ ہوتی ہے اور جلنے

کے بعد نشان کم چھوڑتا ہے

6. حاصل شدہ خشک ٹائٹروسیلیوز کو الکوحل یا ایسی ٹون میں حل کریں یہ پیسٹ کی شکل اختیار کر لیا (نوٹ) بہتر ہے کہ الکوحل میں حل کریں۔ مشاہدے میں آیا ہے کہ ایسی ٹون میں سیلیوز حل کرنے سے اس کے جلنے رفتار اور طاقت کم ہوتی ہے بہتر یہی ہے کہ چارٹ کیلئے یا تو خالص ٹائٹروسیلیوز استعمال کیا جائے یا پھر ٹائٹروسیلیرین اور الکوحل میں اس کا پیسٹ بنائیں

ٹائٹروسیلیوز کے ٹکس

1. بلیک پوڈر = 1 حصہ

ٹائٹروسیلیوز = 2 حصے

یہ بہت جلد شعلہ پکڑتا ہے اور جلنے کے بعد نشان بھی کم چھوڑتا ہے بلیک پوڈر کی جگہ اسٹ پوڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں

2. ٹائٹروسیلیوز = 200 گرام (WNT)

پوٹاشیم ٹائٹریٹ = 75 گرام

سلفر = 8 گرام

نمبر 12 پکڑک ایسڈ

پکڑک ایسڈ بنانے کیلئے جو اجزاء استعمال ہوتے ہیں ان کی مقدار اور تناسب مندرجہ ذیل ہے

فینول (FANOL) = 0.8 gm

شورے کا تیزاب = 16 ml

گندھک کا تیزاب = 16 ml

فینول خاص طور پر بنانے والے صابن لائف ہوائے میں ہوتا ہے اور عام طور پر چراشیوں اور کیڑوں کو مارنے کے لئے فرش

ٹائٹریٹ اور فرشوں میں استعمال ہوتا ہے

تیاری ☆☆☆

16.1 ملی لیٹر گندھک کے تیزاب میں 0.8 فیلول قطروں کی صورت ڈالیں تیزاب کارنگ بنز ہو جائے گا اور اس کو اچھی طرح ہلاتے رہیں

(نوٹ) اگر تیزاب کارنگ بنز نہ ہو تو بیکر کو کچھ دیر کیلئے حرارت دیں

2. دوسرے بیکر میں 16 ملی لیٹر شورے کا تیزاب ڈالیں اور اس کو 30 سے 40 ڈگری تک گرم کریں

3. اب (بیکر نمبر 1) فیلول والے بیکر کو شورے کے تیزاب والے بیکر میں اڈیل دیں

4. اب اس مخلول والے بیکر کو 10 منٹ تک گرم پانی میں رکھیں جس کا درجہ حرارت 80 سے 100 ڈگری تک ہو اور اسکے بعد

اسکو سرد پانی ہی کی مدد سے ٹھنڈا کر لیں اور درجہ حرارت 20 سے 25 ڈگری تک آئیں

5. اب اس مخلول کارنگ ہلکا پیلا ہوگا

6. ایک اور بیکر میں 250 ملی لیٹر ٹھنڈا پانی لیں اور مخلول کو اس پانی میں ڈالیں اور کچھ دیر کے لئے ہلاتے رہیں

7. اب اس میں پیلے ذرات بنیں گے۔ بیکر کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں تاکہ ذرات مکمل طور پر بن جائیں۔ ان ذرات کو

فلٹر کریں اور دھوپ میں خشک کریں

فیلول حاصل کرنے کا طریقہ نمبر 2

اس کیلئے ہم اسپرین کی گولیاں استعمال کریں گے

1. 10 گولیاں اسپرین کی لیں اور تھوڑے سے پانی میں اس کا پیسٹ بنائیں

2. اب اس پیسٹ کے ساتھ 60 ملی لیٹر الکوحل ملائیں اور اچھی طرح ہلائیں

3. اب اس کو فلٹر کریں اور حاصل شدہ مائع کو گرم کریں اسکو اتنا گرم کریں کہ اس میں معمولی سی نمی رہ جائے اب اس کو دھوپ

میں خشک کریں یہی فیلول ہے

طبعی خواص ☆☆☆

1. یہ بغیر رنگ کے ذرات ہیں جو دھوپ میں پیلے ہو جاتے ہیں

2. 120 ڈگری پر پگھلتا ہے۔ اور 260 ڈگری پر اگر زیادہ مقدار میں ہو تو دھماکہ سے پھٹ جاتا ہے۔ عام طور پر

300 ڈگری پر پھٹ جاتا ہے اگر اس کو 160 ڈگری تک گرم کیا جائے تو اس کے اجزاء الگ الگ ہو جاتے ہیں

3. پانی میں آسانی سے حل نہیں ہوتا اگر حرارت بڑھ جائے تو پانی میں حل ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ شورے اور گندھک کے تیزاب اور الکوحل میں حل ہو جاتا ہے
4. جب اس کو گرم کیا جائے تو پگھلتا ہے پھر جلتا ہے پھر کالے یا سفید رنگ کا دھواں دیتا ہے
5. جب اس کو لوہے لپیڈا تا ہے کہ برتن میں رکھا جاتا ہے تو چوٹ سے بچھٹ جاتا ہے اس لئے اس پلاسٹک یا مین کے ڈبے میں رکھا جاتے ہے
- (نوٹ) جن بموں میں پکڑک ایسڈ استعمال ہوتا ہے ان کے اندر پلاسٹک کی تہہ ہوتی ہے سورق اور روشنی کی شعاعیں اس پر اثر انداز نہیں ہوتیں
6. پکڑک ایسڈ خطرناک زہر ہے اسکے اثر سے جلد کا رنگ بدل جاتا ہے منہ کڑوا ہو جاتا ہے طاقت میں کمی اور ہر وقت سر درد ہوتا ہے اسلئے اسکی تیاری میں چہرہ، ہاتھوں اور پہنے ہوئے کپڑوں کو اچھی طرح دھولیں
7. یہ زخم کے جراثیم ختم کرنے کیلئے اور ٹائیفا ئیڈ میں دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے
8. امونیم پکڑک۔ پکڑک ایسڈ اور امونیا کے ملانے سے بنتا ہے

زہر

1. بیٹا لوسیم

خواص☆☆☆

اس زہر کی معمولی مقدار 0.000028 گرام چھتیس گھنٹے میں دشمن کو مارتی ہے یہ دیکھ جانے کے بارہ گھنٹے بعد اچانا کام شروع کرتا ہے یہ سانس کے عمل کو روکتا ہے اس سے کافر اذیت ناک موت مرتا ہے

زہر کی تیاری☆☆☆

☆ ☆ ☆ اجزاء ☆ ☆ ☆

1. مکئی کا آٹا

2. سرخ گوشت کے چھوٹے ٹکڑے

3. تازہ گوہر گیلا

☆ ☆ ☆ طریقہ ☆ ☆ ☆

1. ایک مرتبان لیں اور اس کو آدھے سے زیادہ آٹے سے بھر دیں
2. اب اس میں کھانے کے دو چمچے سرخ گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈالیں
3. اب اس میں ڈیرہ چمچ جانور کا گوہر ڈال دیں (تازہ گوہر)
4. اب مرتبان میں پانی بھر دیں اور دواغج کی جگہ اوپر سے خالی چھوڑ دیں
5. اب مرتبان کو سیل کر کے اندھیری اور تھوڑی گرم جگہ پر زمین میں دفن کر دیں اور دس دن تک دبائے رکھیں گے
6. دس دن کے بعد جب ہم مرتبان کو نکالیں گے اور کھولیں گے اور دھلکن کے منہ پر کافی کے رنگ کے ذرات ہوں گے
7. اس کو احتیاط سے کھرت لیں اور محفوظ کر لیں

☆ ☆ ☆ احتیاطی تدابیر ☆ ☆ ☆

1. مرتبان کا دھلکن ٹین کا ہونا چاہئے
2. جب دھلکن کھولیں تو اپنی آنکھوں منہ اور ہاتھوں اور جسم کو مکمل طور پر ڈھانپ لیں کیونکہ یہ انتہائی باریک ذرات ہوتے ہیں جو کہ وزن میں ہلکے اور ہوا میں آسانی سے اڑتے ہیں

☆ ☆ ☆ استعمال ☆ ☆ ☆

1. یہ کھانے میں انتہائی بدبودار ہوتے ہیں اس کے کھانے میں دینے سے پہلے خصوصی طور پر خوشبو کا اہتمام کریں
2. یہ پانی میں حل نہیں ہوتے لیکن نظر بھی نہیں آتے ہیں
3. اس کو کسی ٹھنڈے شراب میں ڈال کر وی

دوڑنے لگتی ہے منہ سوکھ جاتا ہے اور اس پر شہج کی کنفیٹ طاری ہو جاتی ہے اور مر جاتا ہے اس کے سر بیض کو بچانا مشکل ہے

نمبر 3 الکولا یٹزھر

اجزاء

1. آلوکی کوٹلیں

2. آئیسوپرول الکول

تیاری ☆☆☆

1. آلوکی کوٹلیں لیں اور ان کو اچھی طرح پیس لیں اور ان کو ایک بیکر میں ڈال دیں
2. اب اسی بیکر میں آئیسوپرول الکول ڈالیں اتنا ڈالیں کہ یہ اچھی طرح حل ہو جائے یا ڈوب جائے
3. اب بیکر کا منہ الومینم فائل سے سیل کر دیں اس کو بکلی آگے پر گرم کریں
4. اگر یہ ابلتا شروع ہو جائے تو اس کو آگ سے دور لے جائیں کیونکہ یہ آگ پکڑتا ہے اس کو ابالے بغیر ایک گھنٹے تک گرم کریں
5. اگر اس دوران الکول کم ہو جائے تو اور ڈالیں
6. ایک گھنٹے کے بعد ٹھنڈا کر کے فلٹر کر لیں اس محلول کو بھی ہم بطور ہر استعمال کر سکتے ہیں اس کی دو ٹی لیٹر مقدار خرگوش کو نو منٹ میں مالتی ہے اگر ایک ٹی لیٹر کر لیں تو ایک گھنٹے کے بعد مرتا ہے
7. اگر اس کو ہم کچھ دیر کھلا چھوڑ دیں تو اس سے الکول اڑ جائے گا اور ہم کو خالص پھور سے تنگ کا زہر حاصل ہوگا
8. اس کی 0.06 گرام کی مقدار ہندو کا فر کو مارنے کیلئے کافی ہے یہ کا فر کو ایک گھنٹے کے اندر اندر ہلاک کرتا ہے یہ کسی بھی مشروب میں دیا جاسکتا ہے

نمبر 4 سوڈیم ایزائیڈ

1. یہ سائنٹفک سٹور جہاں عورتوں کا حمل چمک کیا جاتا ہے وہاں سوڈیم ایزائیڈ کا محلول ملے گا اس سے حاملہ عورتوں کا یہ شہاب

- نمیت کیا جاتا ہے یہ پانی میں اچھی طرح حل جاتا ہے اس کی موثر مقدار 1/2 گرام 1 گرام تک کافی ہے
2. اسکا ذائقہ نہیں ہوتا اس لئے پانی کے گلاس میں یا کسی شروب میں پلائیں
3. یہ پانی کی تنگی میں کم از کم ڈیرھ کو ڈالیں جبکہ تنگی میں 600 سے 1000 لیٹر تک پانی ہو شرط ہے کہ ہر کانفر کو 1/2 گرام یا 1 گرام حصّے
4. یہ کانفر 5 یا 6 گھنٹے میں مارتا ہے اور انکشن کی شکل میں بھی لگایا جاسکتا ہے
- (نوٹ) اگر سے پی لے تو وہ بہت زیادہ پانی پی کر اپنی کرے تین دفعہ یہ عمل کرے اور انگلی دیکر اپنی کرے اس کے علاوہ ایک خوراک ☆ کی دیں
5. اسکی خوراک ایک گرام سوڈیم ایزو اینڈ کو 5 ملی لیٹر پانی میں اچھی طرح حل کرنے کے بعد استعمال کریں

• نمبر 5 سائنائیڈ

- سائنائیڈ کی تین اقسام ہیں
- نمبر 1 پوٹاشیم سائنائیڈ
- نمبر 2 سوڈیم سائنائیڈ
- نمبر 3 کیلیشیم سائنائیڈ

خواص ☆☆☆☆

1. یہ شفاف رنگ کے ذرات ہوتے ہیں ان کا کوئی رنگ نہیں ہوتا
2. یہ پانی میں حل ہو جاتے ہیں اور اسکا ذائقہ کڑوے پاؤں جیسا ہوتا ہے
3. اس کی گیس کی مہک بھی کڑوے پاؤں کی طرح ہے
4. اس کی گیس بہت خطرناک ہے یہ فوڈ رازوں سسٹم کو ختم کرتی ہے
5. آج کل امریکی لوگ جیسمیر میں اس کو مزائے موت کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت تیزی سے انسان کو

مارتی ہے یہ 30 سیکنڈ میں انسان کو مارتی ہے

6. خود ساختہ زہر 0.075 گرام مقدار انسان کو 10 سے 15 منٹ تک مارنے کیلئے کافی ہے

7. اگر اسکوٹ موت بنانے کیلئے استعمال کرنا چاہیں تو ہم اسی مقدار کو پانی میں حل کر کے اس کو ہر دن اس کا ایک قطرہ دیتے

رہیں گے اور جوں ہی خوراک مکمل ہو جائے گی تو اس پر موت کی لہر اٹھا رہو جائے گا

(نوٹ) اگر اس کا علاج کیا جائے تو اس کا علاج ناممکن ہے اگر ہو جائے تو اس کا کوئی نہ کوئی حصہ ضائع ہو جائے گا

☆ ☆ ☆ سائنائی کی تیاری ☆ ☆ ☆

پوٹاشیم فیرو سائنائیڈ (KFeCN) + پوٹاشیم کاربونیٹ (Kco3)

8 گرام + 3 گرام

پوٹاشیم فیرو سائنائیڈ پر خشک کے کام استعمال ہوتا ہے اور پوٹاشیم کاربونیٹ مارکیٹ میں عام دستیاب ہے

سوڈیم فیرو سائنائیڈ (NaCN) + سوڈیم کاربونیٹ

8 گرام + 3 گرام

کیلشیم فیرو سائنائیڈ (CaloCN) + کیلشیم کاربونیٹ (CaCo3)

8 گرام + 3 گرام

☆ ☆ ☆☆☆ تیاری کے مراحل ☆ ☆ ☆☆☆

1. 8.1 گرام کسی بھی فیرو سائنائیڈ (پوٹاشیم فیرو سائنائیڈ یا سوڈیم فیرو سائنائیڈ یا کیلشیم فیرو سائنائیڈ) کٹھالی میں ڈالیں اس میں

3 گرام کوئی بھی کاربونیٹ ڈالیں

2. اب کٹھالی کو 30 منٹ تک اچھی طرح گرم کریں (ال شعلہ سے)

3. یہ سیاہی میل رنگ کا ہو جائے گا

4. اب اس میں 15ml پانی ڈالیں اور اس کو اچھی طرح حل کریں

5. اب اس کو فلٹر کریں اور شفاف رنگ کا محلول حاصل ہوگا آپ کا سائنائیڈ تیار ہے

سانائیڈ گیس کی تیاری ☆☆☆☆

1. ایک شیشے کی بوتل میں کوئی بھی فیروسانائیڈ ڈالیں اور کارک سے اس کا منہ بند کریں۔ اب سرچ کی مدد سے گندھک کا تیزاب کارک سے نیکہ کی صورت بوتل میں داخل کریں جو نئی تیزاب فیروسانائیڈ کے ساتھ ملے گا تو فوراً ہی سانائیڈ گیس بن جائے گی سانس کو روکتے ہوئے فوراً نارگٹ پر پھینک دیں
2. یہ انسان کو 30 سیکنڈ میں مارتی ہے خود کو گیس سے بچائیں

نمبر 6 مائیڈروجن سلفائیڈ

ہیڈ ہریلی گیس ہے اور یہ بھی سانائیڈ گیس کی طرح تیار ہوتی ہے

اشیاء ☆☆☆☆

1. سوڈیم سلفائیڈ (Nas) = 2 گرام

2. گندھک کا تیزاب = 5 ملی لیٹر

تیاری ☆☆☆☆

اسکے تیار کرنے کا طریقہ وہی ہے جو سانائیڈ گیس بنانے کا ہے صرف فیروسانائیڈ کی جگہ سوڈیم سلفائیڈ استعمال ہوتا ہے + یہ بھی سانائیڈ کی طرح انتہائی خطرناک زہریلی گیس ہے

نمبر 7 کوبالٹ کلورائیڈ

خصوصیات ☆☆☆☆

1. یہ سرخ رنگ کے ذرات ہوتے ہیں یہ پانی میں اچھی طرح حل ہو جاتے ہیں
2. اسکے شکار کو پچانا ناممکن ہے کیونکہ ہیڈ ہریلی خون میں شامل ہو جاتے ہیں

☆ ☆ ☆ استعمال

1. اسکا پانی میں گھاڑا مخلول بتائیں اور اس میں سے ایک ٹی لیٹر لیں جو کہ رنگ میں سرخ ہو گا اور ایک کافر کیلئے کافی ہو گا
2. اس کو کسی مال رنگ کے شربت میں دیں کیونکہ یہ خود مال ہے
3. دیئے جانے کے 15 منٹ بعد شکار کی حالت ایک شرابی کی طرح ہو جائے گی اور وہ بالکل ست ہو جائے گا اور 2 سے 3 گھنٹے تک مر جائے گا

☆ ☆ ☆ تیاری

کوہالت + نمک کا تیزاب (HCL)

57 گرام + 33 گرام

57 گرام کوہالت کو 33 گرام نمک کا تیزاب میں حل کریں۔ کیمیائی رد عمل کے بعد اس کو گرم کریں آپ کا کوہالت کلورائیڈ تیار ہے اور یہ سرخ رنگ کے ذرات ہوں گے۔

نمبر 8 اینتالین

1. اینتالین کپڑے اور ہر قسم کی رنگائی میں استعمال ہوتا ہے یہ کیمیکل اینشور سے دستیاب ہے۔
2. اس کا ڈالھدیلیموں جیسا ہے۔
3. اسکی موثر مقدار 1 سے 2ml لیٹر ہے اگر کسی کافر کو دیں تو بارہ گھنٹے میں مر جاتا ہے۔ اگر دو تین گھنٹے میں مارنا مقصود ہو مقدار دو گنی کر دیں۔ اس دوران اسکی حالت نفی جیسی ہو جائے گی۔ یہ معدہ اور خون میں داخل ہو کر اثر کرتا ہے اس کو لین سلکٹین کے پانی یا شروب میں دیا جاسکتا ہے

نمبر 9 نکوٹین

1. تین عدد سرگیت کا تمباکو لیں اور اس کو ایک بیکر میں ایسوپرول الکوہل کے ساتھ تھوڑی دیر گرم کریں
2. بیکر کا مینہ المونیم فائل کے ساتھ بند کریں۔ اگر مخلول اٹھنے لگے تو فوراً بیٹر سے اتار لیں۔ زیادہ گرم ہونے کی صورت آگ

لگنے کا خطرہ ہے

3. فلٹر کر کے محلول کو سنبھالیں یہی کوٹھن ہے جو کہ ایک آدمی کو مارنے کیلئے کافی ہے

نمبر 10 سوڈیم نائٹرائٹ

ٹائٹروائیٹ (HNO₂) = 63mg

سوڈیم کلورائیڈ (NaCl) = 40gm

40 گرام نمک کو 63 گرام ٹائٹروائیٹ سے ملائیں اور گرم کر لیں ملنے پر اس موجودہ ہائیڈروکلورک اڑ جائے گا اور یہ سفید رنگ کے کرشل رہ جائیں گے یہی سوڈیم نائٹرائٹ ہے۔

(نوٹ: یہ کپڑوں کے رنگنے کے کا آتا ہے اور عام دستیاب ہے)

نمبر 11 کلوروفارم

اس میں مندرجہ ذیل اشیاء استعمال ہوتی ہے

میٹھین + کلورین

1 + 3

دونوں کے تناسب کا خیال رکھتے ہوئے ملائیں کلوروفارم تیار ہے

نمبر 12 چھوکر مارنے زہر

وہ تمام زہر جو پانی میں حل ہوتے ہیں چھوکر مارنے زہر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ ان کی بھی مقدار عام طور پر اتنی ہوتی

ہے جتنی کھانے یا آنکھ لگنے کے ذریعے دیتے ہیں

اس مقصد مندرجہ ذیل اشیاء استعمال کرتے ہیں

(1) زیتون کا تیل (2) نیویا کریم (3) ڈائی میٹھیل سلفر آکسائیڈ (یہ کھوڑوں کو زلیں سے پہلے ماش کرنے کے کام آتا ہے)

تیاری ☆☆☆☆

لگنے کا خطرہ ہے
3. فلٹر کر کے محلول کو سنبھالیں یہی کوئٹین ہے جو کہ ایک آدمی کو مارنے کیلئے کافی ہے

نمبر 10 سوڈیم نائٹرائٹ

ٹائٹروائیٹ (HNO₂) = 63mg

سوڈیم کلورائیڈ (Nac) = 40gm

40 گرام نمک کو 63 گرام ٹائٹروائیٹ سے ملائیں اور گرم کر لیں، ملنے پر اس موجودہ ہائیڈروکلورک اڑ جائے گا اور یہ سفید رنگ کے کرشل رہ جائیں گے یہی سوڈیم نائٹرائٹ ہے۔
(نوٹ: یہ کپڑوں کے رنگتے کے کا آتا ہے اور عام دستیاب ہے)

نمبر 11 کلوروفارم

اس میں مندرجہ ذیل اشیاء استعمال ہوتی ہے

میٹھین + کلورین

1 + 3

دونوں کے تناسب کا خیال رکھتے ہوئے ملائیں کلوروفارم تیار ہے

نمبر 12 چھوکر مارنے زہر

وہ تمام زہر جو پانی میں حل ہوتے ہیں چھوکر مارنے زہر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ ان کی بھی مقدار عام طور پر اتنی ہوتی

ہے جتنی کھانے یا آنکھ لگنے کے ذریعے دیتے ہیں

اس مقصد میں مندرجہ ذیل اشیاء استعمال کرتے ہیں

(1) زینون کا تیل (2) نیڈیا کریم (3) ڈائی میٹھیل سلفر آکسائیڈ (یہ کھوڑوں کو ریس سے پہلے ماش کرنے کے کام آتا ہے)

تیاری ☆☆☆☆

10ml ڈائی میتھائل سلفر آکسائیڈ لیں اس میں دو گرام پوٹاشیم سائٹریٹ پاؤڈر اور صل ہونے والا زہر ڈالیں۔ اچھی طرح صل کریں تاکہ آپس میں مل جائیں چھو کر مارنے والا زہر تیار ہے

معدقت زہر کی ادویات

اشنی ڈاٹ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆

اس میں جو اشیاء استعمال ہوتی ہیں اس کی مقدار اور تناسب حسب ذیل ہیں

1. چار گول (عام کوئلہ) = 2 گرام

2. کلیمینٹ = 1 گرام

3. بیکسول = 1 گرام

ٹینک ایسڈ بنانے کا طریقہ کار

1. ایک کپ پانی میں 10:8 حصے پلین چائے کے ڈالیں اچھی طرح جوش آنے پر پتی کو فلٹر کریں

2. باقی بچے ہوئے کو اچھی طرح ابالیں حتی کہ وہ گاڑھی شکل اختیار کر لیں

3. اس کے بعد اس کو تار کر شیشے یا سٹیل کو پلٹ پر پھیلا دیں

4. اس کو دھوپ میں سکھائیں خشک ہونے پر اس کو کھری کر علیحدہ کر لیں۔ ٹینک ایسڈ تیار ہے

اشنی ڈاٹ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆

2.1 حصے چار گول لے کر اسے اچھی طرح پیس کر چھان لیں۔

1.2 حصہ کلیمینٹ آکسائیڈ لے کر اسے بھی اچھی طرح پیس کر چھان لیں۔ اور چار گول کے ساتھ مکس کریں م

3. اس کے بعد ٹینک ایسڈ کو پیس کر چھان لیں اور ایک گرام لے کر دونوں چیزوں میں ملا دیں۔ ہمارا اشنی ڈاٹ تیار ہے۔

استعمال ☆☆☆☆☆☆☆☆☆

یہ پیسٹ کے اندر جانے والے زہر کے اثر زائل کرنے کے کام آتا ہے ان تمام اشیاء کو تناسب کے ساتھ مکس کریں اور اس میں

سے 2 چمچے خانی کپ میں ڈالیں اور اسے آدھا بھر دیں اور کس کریں اور پی لیں یہ زہر کو چوس کر کسی اور شکل میں تبدیل کر دے گا۔ اگر کوئی فرق نہ ہو تو اسی مقدار کی ایک اور خوراک دے دیں
(نوٹ) آپ ٹینک ایسڈ تیار کر رہے ہوں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ چائے کی پتی اپنا رنگ مکمل طور پر چھوڑ جائے

سانس کی تکلیف یا بچاؤ کا انجکشن
اگر آپ سانس لینے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہو تو اناکل ٹائیٹریٹ لگا دیں

☆☆☆☆☆☆☆☆ خفیہ روشنائی

نمبر 1. کوبالٹ ٹائیٹریٹ + پانی

25ml + 3gm

کوبالٹ ٹائیٹریٹ کیسٹ کی دکان سے ہے آسانی دستیاب ہے جب اس محلول سے لکھیں گے تو سو کھٹے پر عتاب ہو جائے گا۔ اسکو دوبارہ ظاہر کرنے کیلئے محلول کھور (جسکا بازاری نام کلورائز ہے) روٹی کے ساتھ لگا کر کاغذ پر پھیریں تو سیاہی ظاہر ہوگی کلورائز کپڑے اور کر آکری کے کام آتا ہے

نمبر 2. گنڈھک کاتیزاب (خالص) + پانی

10ml + 0.5ml

اسکو دوبارہ ظاہر کرنے کیلئے کاغذ کو میٹر پر رکھ کر تھوڑا گرم کریں۔ یا استری پھیریں

نمبر 3. اسپرین + پانی

2 گولیاں + 10ml

گولیوں کو پانی میں حل کریں اور اس محلول سے لکھیں۔ اس کو دوبارہ ظاہر کرنے کیلئے اس کاغذ کو پانی میں ڈبوئیں

نمبر 4. کوبالٹ ٹائیٹریٹ + پانی

6ml + 0.5mg

اس پانی سے لکھیں اور شکل کریں۔ دوبارہ ظاہر کرنے کیلئے کمزور نمک کاتیزاب روٹی کے ساتھ پھیریں لکھائی ظاہر ہو جائے گی

نمبر 5. پیاز کے پانی سے لکھیں اور دوبارہ ظاہر کرنے کیلئے استری پھیر دیں